Entomologica, XXI, Bari, 20-XII-1986

FERNANDO ANGELINI

Coleotterofauna del Massiccio del Pollino (Basilicata-Calabria) *(Coleoptera)*

Nella presente memoria riferisco sui risultati delle ricerche coleotterologiche che ho condotto sul Massiccio del Pollino negli anni dal 1969 al 1985, rivolgendo particolare attenzione a microambienti poco o niente affatto considerati da parte degli innumerevoli entomologi che hanno visitato tale complesso montuoso. Infatti il mio interesse si è anche rivolto all'habitat subcorticale di ceppaie e tronchi abbattuti, al legno marcescente, ai depositi di foglie morte nel sottobosco, ai carpofori fungini.

Ciò ha fruttato il reperimento di 745 specie di Coleotteri nuove per il Pollino, di cui 251 sono nuove anche per la Basilicata o la Calabria e comprendono: *a*) 22 specie di particolare interesse perché finora note di singole Regioni della Penisola o delle Isole; *b*) 4 specie nuove per la fauna italiana; *c*) 1 specie recentemente descritta altrove, nuova per la scienza.

Onde tracciare un quadro complessivo della coleotterofauna del territorio in argomento, l'esposizione di detti reperti inediti viene qui integrata con quanto è già comparso in letteratura per un totale di 1.824 specie di 86 famiglie. Del Pollino erano già note, infatti, 1.079 specie, in gran parte (793 specie) riportate in specifici lavori pubblicati negli Annali dell'Istituto e Museo di Zoologia dell'Università di Napoli o segnalate da COLONNELLI (1974) e, per il resto (286 specie), segnalate da vari Autori in oltre ottanta lavori di sistematica e/o corologia.

Desidero porgere un vivo ringraziamento agli amici Dr. LUIGI DE MARZO (Istituto di Entomologia Agraria dell'Università di Bari) e Dr. FERNANDO MONTEMURRO (Taranto), per la collaborazione nello svolgimento di alcune escursioni, ed inoltre tutti coloro che, attraverso la determinazione del mate-

---

Questo lavoro fa parte delle ricerche programmate e svolte dall'Istituto di Entomologia Agraria dell'Università di Bari sulla Coleotterofauna dell'Italia meridionale. È stato realizzato parzialmente con il contributo finanziario del Ministero Pubblica Istruzione, quota 60%.

riale, la revisione degli elenchi e l'invio di dati, riferimenti bibliografici e consigli, mi hanno permesso di realizzare la presente nota:

Sig. PIETRO ABBAZZI (*Curculionidae*), Dr. VITTORIO ALIQUÒ (*Tenebrionidae* e *Scarabaeidae*), Dr. PAOLO AUDISIO (*Silphidae, Cleridae, Nitidulidae* e *Rhizophagidae*), Dr. R. BATTEN (*Mordellidae*), Dr. CLAUDE BESUCHET (*Scydmaenidae, Ptiliidae* e *Pselaphidae*), Dr. MAURIZIO BIONDI (*Chrysomelidae: Alticini*), Dr. MARCO BOLOGNA (*Oedemeridae* e *Meloidae*), Sig. ITALO BUCCIARELLI (*Carabidae, Catopidae, Pythidae* e *Anthicidae*), Dr. ROBERTO CALDARA (*Curculionidae*), Dr. CLAUDIO CANEPARI (*Coccinellidae*), Dr. GIORGIO CASTELLINI (*Scydmaenidae* e *Pselaphidae*), Dr. ENZO COLONNELLI (*Curculionidae*), Dr. GIANFRANCO CURLETTI (*Buprestidae*), Sig. MAURO DACCORDI (*Chrysomelidae*), Dr. MICHAEL DARBY (*Ptiliidae*), Dr. SEBASTIAN ENDRODY-YOUNGA (*Clambidae*), Dr. F. ESPANOL (*Anobiidae*), Dr. SILVIO FAILLA (*Buprestidae*), Sig. GIORGIO FERRO (*Hydrophilidae*), Dr. GIULIO GARDINI (*Tenebrionidae*), Rev. Don ELIO GENTILI (*Hydrophilidae*), Sig. CARLO GIUSTO (*Apionidae*), Dr. ALFREDO GUGLIELMI (*Elateridae*), Dr. ZOLTAN KASZAB (*Melandryidae*), Dr. JABLOKOFF KHNZORIAN (*Erotilidae, Micetophagidae, Ptinidae*), Prof. BERNARD KLAUSNITZER (*Helodidae*), Dr. D. G. H. HALSTEAD (*Dermestidae*), Dr. PAVEL HOZMAN (*Staphylinidae*), Dr. VLADIMIR KALIK (*Dermestidae*), Dr. JOHNSON COLIN (*Ptiliidae, Cryptophagidae, Lathridiidae* e *Anobiidae*), Sig. PIERINO LEO (*Tenebrionidae*), Dr. CARLO LEONARDI (*Chrysomelidae: Alticini*), Dr. GIANFRANCO LIBERTI (*Melyridae*), Sig. ANDREA LIBERTI (*Elateridae*), Dr. GUSTAV A. LOHSE (*Cisidae* e *Anobiidae*), Sig. FERDINANDO MAGINI (*Cerambycidae*), Sig. LUIGI MAGNANO (*Curculionidae*), Prof. GIORGIO MARCUZZI (*Tenebrionidae*), Dr. ALESSANDRO MASCAGNI (*Heteroceridae*), Dr. LUIGI MASUTTI (*Scolytidae*), Prof. ALESSANDRO MINELLI (*Melyridae*), Sig. VITTORIO MONZINI (*Carabidae*), Sig. CARLO MOSCARDINI (*Cantharidae*), Dr. HEINZ W. MUCHE (*Alleculidae*), Dr. HANS MUHLE (*Buprestidae*), Dr. J. MUONA (*Staphylinidae, Eucnemidae* e *Melandryidae*), Prof. MASSIMO OLMI (*Dryopidae, Elmididae* e *Heteroceridae*), Dr. GIUSEPPE OSELLA (*Curculionidae*), Dr. JOSÉ CARLOS OTERO (*Cryptophagidae*), Sig. MAURIZIO PAVESI (*Carabidae*), Dr. CARLO PESARINI (*Curculionidae*), Dr. HELIO PIEROTTI (*Scarabaeidae*), Dr. RICCARDO PITTINO (*Scarabaeidae*), Dr. ROBERTO POGGI (*Pselaphidae*), Dr. V. PUTHZ (*Staphylinidae: Stenus*), Dr. ENRICO RATTI (*Cucujidae*), Sig. SERGIO RIESE (*Elateridae*), Sig. VITTORIO ROSA (*Staphylinidae*), Dr. WOLFGANG H. RUCKER (*Merophysiidae* e *Lathridiidae*), Sig. LIVIO TAMANINI (*Scaphidiidae*), Sig. MICHELE TEDESCHI (*Coccinellidae*), Dr. PIERPAOLO VIENNA (*Histeridae*), Sig. MARCELLO ZAMPETTI (*Bruchidae*), Dr. ADRIANO ZANETTI (*Staphylinidae*), Sig. STEFANO ZOIA (*Catopidae*), Dr. W. WITTMER (*Cantharidae: Malthinus* e *Malthodes*).

MATERIALI E METODI

Le raccolte sono state svolte nei mesi da aprile a ottobre degli anni dal 1969 al 1985 nel corso di 15 escursioni della durata variabile da 1 a 10 giorni. Limitatamente ai mesi primaverili, è stata esaminata la fauna floricola mentre in ogni periodo si sono raccolti Coleotteri micetofagi, corticicoli, coprofagi e della lettiera. Le tecniche adottate sono state:

a) raccolta a vista e con vaglio sotto la corteccia di tronchi abbattuti e nel terreno sottostante agli stessi, sfasciume di legno marcio, nei carpofori fungini di ogni consistenza, nello sterco di bovini;
b) vaglio di foglie morte nel sottobosco, carie di alberi, terriccio alla base di alberi e arbusti;
c) retino per falcio su erbe e infiorescenze, nei prati o ai margini di boschi e torrenti;
d) ombrello entomologico per alberi e arbusti;
e) trappole con varie esche (carne, ossa, carpofori fungini).

Il materiale è stato in gran parte sottoposto all'esame dei diversi specialisti, ma rimangono ancora da studiare una piccola parte di *Corylophidae*, *Staphylinidae*, *Mycetophagidae* ed *Endomychidae* e una gran parte di *Helodidae*, *Throscidae* e *Phalacridae*.

Riguardo alla seguenza di esposizione dei reperti, si precisa che: per le famiglie ci si è basati sull'opera *Die Käfer Mitteleuropas* salvo a tener conto di fonti più recenti nei casi di smembramento (*Dryopidae*, *Curculionidae*) o riunificazione (*Carabidae*); nell'ambito di ciascuna famiglia, generi e specie sono stati disposti in ordine alfabetico, in mancanza di un apposito volume della « Fauna d'Italia », altrimenti si è adottata la sequenza stabilita dagli Autori di tali opere.

Le specie vengono contraddistinte da un * se nuove per la regione calabro-lucana, con ** se particolarmente interessanti, con *** se nuove per fauna italiana; quelle che risultano endemiche del Massiccio del Pollino o che hanno in esso il loro limite meridionale di diffusione, sono contraddistinte, rispettivamente, con i simboli (E) e (M).

Se la specie è stata reperita in un solo esemplare ciò viene esplicitamente indicato, diversamente sono state usate le seguenti abbreviazioni:

r. (raro) se reperita una sola volta in 2-5 esemplari;
p.c. (poco comune) se reperita in più riprese ma in 2-5 esemplari;
c. (comune) se reperita in più riprese ed in 6-15 esemplari;
m.c. (molto comune) se reperita in più riprese ed in più di 15 esemplari.

ELENCO DELLE STAZIONI DI RACCOLTA

Versante lucano (prov. Potenza):

1. Terranova Pollino, m 800-1100, dintorni e Canale Duglia.
2. Strada Terranova P.-Duglia, m 1000-1200.
3. Acqua Tremola, m 1400.
4. Duglia, m 1300-1400.
5. Lago Ricciardule, m 1300.
6. Piano delle Mandre, m 1400-1500.
7. Cugno Ruggeri, m 1400-1500.
8. Pantano Grande, m 1380.
9. Lago della Duglia, m 1380.
10. Lago Fondo, m 1500.
11. Cugno dell'Acero, m 1500-1600.
12. Pendici sud-est di Serra delle Ciavole, m 1900.
13. Pendici nord-ovest di Serra Dolcedorme, m 2000.
14. Canale di Malevento, m 1800-1850.
15. Piano Pollino, m 1800.
16. Piano Toscano, m 1800.
17. Fontana di Rummo, m 1670.
18. Madonna di Pollino, m 1570.
19. Colle dell'Impiso, m 1570.
20. Serra del Prete, pendici nord-est, m 1550-1600.
21. Vaccuarro, m 1450-1500.
22. Valloncello di Viggianello, m 1500-1650.
23. Colle Gaudolino, m 1680.
24. Timpa del Demonio, m 1300.
25. Cozzo di Visitone, m 1400.
26. Vallone e Piano Zaverna, m 1300-1350.
27. Serra del Prete, pendici ovest, m 1600.
28. Valle Malvento, m 1510-1590.
29. Piano Ruggio, m 1510-1590.
30. Cozzo Dimoniello, m 1480.
31. Pedarreto, m 1480.
32. Fosso di Mauro, m 1500-1550.
33. Coppola di Paola, pendici nord-est, m 1500-1700.



Fig. 1 - Ubicazione dei biotopi esaminati sul Massiccio del Pollino. I numeri si riferiscono all'elenco delle stazioni di raccolta.

Versante calabro (prov. Cosenza):

34. Coppola di Paola, pendici sud e vetta, m 1700-1910.
35. Colle del Dragone, m 1600.
36. Vallone della Caballa, m 1350-1450.
37. Anticristo, m 1100-1300.
38. Campotenese, m 950-980.

CARABIDAE

Cicindela campestris L.: MAGISTRETTI, 1955 a: Anticristo, r., VII.

Cychrus italicus Bon.: MAGISTRETTI, 1955 a: 1 sub (*C. italicus meridionalis* Chaud.); Piano Pollino, 1 ex., VII; Piano Ruggio, r., VI.

Carabus preslii ssp. *neumeyeri* Schaum: BRUNO, 1970: 52 (sub *C. hortensis neumeyeri* Schaum);

Carabus convexus F.: GOBBI, 1973: 34 (sub *C. convexus paganettii* Born);

Carabus lefebvrei ssp. *bayardi* Sol.: MAGISTRETTI, 1955 a: 3 (sub *C. intricatus lefebvrei* Dej.);

Carabus violaceus ssp. *picenus* Villa: MAGISTRETTI, 1955 a: 51.

Carabus coriaceus L.: MAGISTRETTI, 1955 a: 2 (sub *C. coriaceus* n. *mediterraneus* Born).
Calosoma inquisitor L.: MAGISTRETTI, 1955 a: 4;
Calosoma sicophanta L.: MAGISTRETTI, 1965: 58; Terranova P., 1 ex., VI.
Leistus spinibarbis ssp. *fiorii* Lutsh.: MAGISTRETTI, 1955 a: 4; Terranova P., 1 ex., VI; Lago Fondo, r., VI;
Leistus rufomarginatus Duft.*: Duglia, r., VI;
Leistus fulvibarbis Dej.: MAGISTRETTI, 1955 a: 4; Pantano Grande, r., VI.
Nebria psammodes ssp. *schreibersi* Dej.: MAGISTRETTI, 1955 a: 4; Cugno Ruggeri, r., VI;
Nebria kratteri Dej.: BAUDI, PICCIOLI & CAVANNA, 1882: 63; MAGISTRETTI, 1955 a: 5; Duglia, c., VI-VIII; Valle Malvento, p.c., VI; Piano Ruggio, c., VII;
Nebria brevicollis F.: Vacquarro, r., VI.
Notiophilus pusillus Waterh.: MAGISTRETTI, 1955 a: 82;
Notiophilus aquaticus L.: BAUDI, PICCIOLI & CAVANNA, 1882: 63; MAGISTRETTI, 1955 a: 83;
Notiophilus substriatus Waterh.: Terranova P., 1 ex., VI;
Notiophilus geminatus Dej.: Terranova P., p.c., VI-VII;
Notiophilus rufipes Curt.: MAGISTRETTI, 1955 a: 5; Piano Ruggio, r., VII;
Notiophilus biguttatus F.: MAGISTRETTI, 1955 a: 5; Colle dell'Impiso, p.c., VI; Pedarreto, r., VI.
Loricera pilicornis ssp. *apennina* Bin.*: Duglia, r., VI.
Clivina fossor L.: MAGISTRETTI, 1955 a: 6.
Siagona europaea Dej.: Duglia, p.c., IX; Campotenese, 1 ex., VII.
Asaphidon caraboides ssp. *nebulosum* Rossi: MAGISTRETTI, 1955 a: 6; Cugno Ruggeri, 1 ex., VII;
Asaphidon rossii Schaum: MAGISTRETTI, 1955 a: 6; Terranova P., r., VI;
Asaphidon stierlini Heyd.: MAGISTRETTI, 1955 a: 6;
Asaphidon curtum Heyd.: Terranova P., 1 ex., VI.
Bembidion lampros Herbst: MAGISTRETTI, 1955 a: 6; Acqua Tremola, r., VI;
Bembidion puntulatum ssp. *obscuripes* Müll.: Piano Ruggio, 1 ex., VIII;
Bembidion bipunctatum ssp. *pyritosum* Rossi: MAGISTRETTI, 1955 a: 7; Pantano Grande, r., VII;
Bembidion geniculatum Heer.: MAGISTRETTI, 1955 a: 7;
Bembidion bugnioni Dan.: MAGISTRETTI, 1955 a: 7; Duglia, 1 ex., VIII;
Bembidion nitidulum Marsh.*: Fosso di Mauro, r., VI;
Bembidion dalmatinum ssp. *latinum* Net.: MAGISTRETTI, 1955 a: 8;
Bembidion gudenzii Neri: Duglia, 1 ex., IX;

Bembidion praeustum ssp. *fauveli* Ganglb.: MAGISTRETTI, 1955 a: 8; Duglia, 1 ex., IX, *leg.* e *coll.* MONTEMURRO;
Bembidion italicum De Monte: MAGISTRETTI, 1955 a: 8;
Bembidion occidentale Müll.: Duglia, c., VIII; Piano Ruggio, c., VI-VII;
Bembidion andreae ssp. *bualei* Duv.: MAGISTRETTI, 1955 a: 8;
Bembidion hypocrita Dej.: MAGISTRETTI, 1955 a: 9;
Bembidion eques ssp. *nobile* Rottbg.: MAGISTRETTI, 1955 a: 9; Vacquarro, 1 ex., VI; Valle Malvento, 1 ex., VII;
Bembidion decorum ssp. *ticinense* Meyer: MAGISTRETTI, 1955 a: 8; (M);
Bembidion jaqueti ssp. *apenninum* De Monte: MAGISTRETTI, 1955 a: 9; (M);
Bembidion genei ssp. *illigeri* Net.: MAGISTRETTI, 1955 a: 9; Acqua Tremola, r., VI;
Bembidion callosum Küst.: MAGISTRETTI, 1955 a: 9; Vallone Zaperna, 1 ex., VI; Colle del Dragone, r., VI-VII;
Bembidion latiplaga Chaud.: Piano Ruggio, 1 ex., VIII;
Bembidion escherichi ssp. *paganettii* Net.: MAGISTRETTI, 1955 a: 7;
Bembidion luigionii Müll.*: Duglia, r., IX, *leg.* e *coll.* MONTEMURRO.
Tachys sexstriatus Duft.: MAGISTRETTI, 1955 a: 9.
Tachyta nana Gyll.: MAGISTRETTI, 1955 a: 10; Duglia, 1 ex., IX; (M).
Perileptus areolatus Creutz.: MAGISTRETTI, 1955 a: 10.
Trechus angelae Magr.: MAGRINI, 1984: 247-258; (E);
Trechus quadristriatus Schrk.: MAGISTRETTI, 1955 a: 10; Duglia, r., VIII;
Trechus obtusus spp. *lucanus* Foc.: FOCARILE, 1949: 71; MAGISTRETTI, 1955 a: 10; Coppola di Paola, rif. Rotonda, pendici nord-est, p.c., VI-VII;
Trechus schatzmayri Foc.: FOCARILE, 1949: 73; MAGISTRETTI, 1955 a: 10; Duglia, p.c., VIII-IX; (E).
Chlaenius spoliatus Rossi: MAGISTRETTI, 1965: 249; Lago Fondo, 1 ex., VI;
Chlaenius velutinus Duft.: Campotenese, 1 ex., VI;
Chlaenius vestitus Payk.: Duglia, r., IX; Vacquarro, 1 ex., VI;
Chlaenius chrysocephalus Rossi: MAGISTRETTI, 1965: 256.
Badister bipustulatus F.: MAGISTRETTI, 1955 a: 10; Campotenese, r., VI.
Licinus silphoides Rossi: BAUDI, PICCIOLI & CAVANNA, 1882: 64; MAGISTRETTI, 1955 a: 11; Duglia, r., VI-VII;
Licinus italicus Puel.: MAGISTRETTI, 1955 a: 262; Piano Ruggio, 1 ex., VI; (M);
Licinus cassideus F.: GOBBI, 1973: 34; (M).
Amblystomus levantinus Reitt.*: Duglia, r., VI; Cugno Ruggeri, 1 ex., VI;
Amblystomus metallescens Dej.: MAGISTRETTI, 1955 a: 12.
Carterus dama ssp. *gilvipes* La Brul.: MAGISTRETTI, 1955 a: 12.

Ditomus clypeatus Rossi: MAGISTRETTI, 1955 a: 12.
Acinopus picipes Ol.: MAGISTRETTI, 1955 a: 12; Piano Ruggio, 1 ex., VII;
Acinopus megacephalus Rossi: Campotenese, r., VII.
Ophonus sabulicola ssp. *columbinus* Germ.*: Piano Ruggio, r., VII;
Ophonus cordatus Duft.: MAGISTRETTI, 1955 a: 13; (M);
Ophonus melleti ssp. *zigzag* Costa: MAGISTRETTI, 1955 a: 13;
Ophonus azureus ssp. *supremus* Schaub.: Terranova P., r., VI; Campotenese, 1 ex., VII.
Harpalus pubescens Müll.: MAGISTRETTI, 1955 a: 13; Colle del Dragone, r., VII;
Harpalus aeneus F.: MAGISTRETTI, 1955 a: 13; Anticristo, r., VI;
Harpalus oblitus Dej.: MAGISTRETTI, 1965: 291; Terranova P., 1 ex., V;
Harpalus distinguendus Duft.: MAGISTRETTI, 1969: 198; Duglia, r., VI;
Harpalus dimidiatus Rossi: MAGISTRETTI, 1955 a: 13; Duglia, 1 ex., V;
Harpalus serripes Quens.: MAGISTRETTI, 1955 a: 14;
Harpalus rubripes Duft.: MAGISTRETTI, 1955 a: 14; Valle Malvento, 1 ex., VI; Pedarreto, r., VI-VII;
Harpalus sulphuripes ssp. *decolor* Schaub.: MAGISTRETTI, 1955 a: 14; Vacquarro, r., VI; Anticristo, c., VII;
Harpalus honestus Duft.: MAGISTRETTI, 1955 a: 14; (M);
Harpalus rufitarsis ssp. *decipiens* Dej.: MAGISTRETTI, 1955 a: 14;
Harpalus attenuatus Steph.: MAGISTRETTI, 1955 a: 15; Pedarreto, 1 ex., VI;
Harpalus impressus ssp. *latianus* Schaub.: MAGISTRETTI, 1955 a: 15; Terranova P., 1 ex., VI; Campotenese, 1 ex., VII;
Harpalus tardus Panz.: Valle Malvento, p.c., VI; Piano Ruggio, 1 ex., VI; Pedarreto, 1 ex., VI.
Parophonus maculicornis Duft.: Cugno dell'Acero, 1 ex., VI.
Trichotichnus nitens Heer: MAGISTRETTI, 1955 a: 15; Vacquarro, 1 ex., VI; Valle Malvento, r., VI; Piano Ruggio, 1 ex., VIII; Colle del Dragone, r., VII.
Stenolophus teutonus Schrk.: Piano Ruggio, 1 ex., VII; Anticristo, r., VII;
Stenolophus abdominalis Gené: Terranova P., 1 ex., V; (M).
Egadroma marginata Dej.: Piano Ruggio, 1 ex., VIII.
Acupalpus dorsalis F.: Campotenese, 1 ex., VII.
Scybalicus oblongiusculus Dej.: Valle Malvento, 1 ex., VI.
Anisodactylus binotatus F.: Terranova P., 1 ex., VI; Acqua Tremola, r., VI.
Amara ovata F.: MAGISTRETTI, 1955 a: 15;
Amara aenea Deg.: MAGISTRETTI, 1955 a: 15;
Amara eurynota Panz.: MAGISTRETTI, 1955 a: 15;

Amara familiaris Duft.: MAGISTRETTI, 1969: 203; Piano Ruggio, r., VI;
Amara anthobia Villa: MAGISTRETTI, 1955 a: 16; Duglia, r., VIII; Valle Malvento, r., VI; Piano Ruggio, c., VII;
Amara lucida Duft.: MAGISTRETTI, 1955 a: 16;
Amara praetermissa Sahlb.: MAGISTRETTI, 1955 a: 156; (M);
Amara apricaria Payk.: BAUDI, PICCIOLI & CAVANNA, 1882: 65 (sub. *Bradytus apricarius* Payk.); MAGISTRETTI, 1955 a: 16;
Amara aulica Panz.: MAGISTRETTI, 1955 a: 16; Valle Malvento, r., VIII; Anticristo, 1 ex., VII;
Amara sicula Dej.: MAGISTRETTI, 1955 a: 16.
Zabrus tenebroides Goeze: Duglia, r., VI; Valle Malvento, 1 ex., VI;
Zabrus costai Heyd.: MAGISTRETTI, 1955 a: 17; (M).
Stomis pumicatus Panz.: Madonna di Pollino, 1 ex., VI; Valle Malvento, p.c., VI-VII.
Poecilus cupreus ssp. *calabrus* Flach.: Cugno dell'Acero, 1 ex., VII;
Poecilus angustatus Duf.: MAGISTRETTI, 1955 a: 18.
Pterosticus niger Schall.: Terranova P., 1 ex., VI;
Pterosticus nigrita F.: MAGISTRTETI, 1955 a: 19; Terranova P., r., V; Duglia, c., VIII; Piano Ruggio, r., VI-VII;
Pterosticus strenuus Panz.: MAGISTRETTI, 1955 a: 19;
Pterosticus unctulatus ssp. *apenninus* Dej.: MAGISTRETTI, 1955 a: 19; Piano Pollino, r., VII; Colle dell'Impiso, r., VI; Valle Malvento, c., VI; Piano Ruggio, c., VI-VIII; Coppola di Paola, pendici nord-est, r., VII;
Pterosticus melas ssp. *italicus* Dej.: MAGISTRETTI, 1955 a: 20; molto comune ovunque, V-IX;
Pterosticus cristatus ssp. *picipes* Chaud.: MAGISTRETTI, 1955 a: 20; Duglia, 1 ex., IX; Valle Malvento, 1 ex., VIII;
Pterosticus bicolor ssp. *amorei* Ganglb.: MAGISTRETTI, 1955 a: 20; molto comune ovunque, V-IX.
Abax ater ssp. *curtulus* Fairm.: MAGISTRETTI, 1955 a: 20; Terranova P., r., VI.
Percus bilineatus Dej.: MAGISTRETTI, 1955 a: 21; Duglia, 1 ex., IX; Coppola di Paola, pendici nord-est, 1 ex., VI; (M).
Platyderus canaliculatus ssp. *jannonei* Bin.: MAGISTRETTI, 1955 a: 21; Cugno dell'Acero, 1 ex., VII.
Calathus montivagus Dej.: MAGISTRETTI, 1955 a: 25; Duglia, r., IX; pendici sud-est di Serra delle Ciavole, r., VI; Canale di Malevento, 1 ex., VI; Anticristo, 1 ex., VI; Campotenese, m.c., VI-VIII;
Calathus fracassii Heyd.: MAGISTRETTI, 1955 a: 24 (sub *C. luctuosus fracassii* Heyd.); Vacquarro, 1 ex., VI;

Calathus sirentensis D'Am.: MAGISTRETTI, 1955 a: 24; (M);
Calathus fuscipes ssp. *latus* Serv.: MAGISTRETTI, 1955 a: 25; molto comune ovunque, VI-X;
Calathus mollis Marsh.: MAGISTRETTI, 1955 a: 26; Valle Malvento, 1 ex., VI; Piano Ruggio, 1 ex., VII;
Calathus melanocephalus L.: BAUDI, PICCIOLI & CAVANNA, 1882: 65; MAGISTRETTI, 1955 a: 26; Duglia, r., VI-VII;
Calathus piceus Marsh.: MAGISTRETTI, 1955 a: 26; Valle Malvento, p.c., VIII; Piano Ruggio, 1 ex., VI; Anticristo, 1 ex., VII.
Laemosthenes venustus Dej.*: Anticristo, 1 ex., VI.
Synuchus nivalis Panz.: MAGISTRETTI, 1955 a: 26.
Odontonyx glabricollis Germ.: MAGISTRETTI, 1955 a: 26 (sub *Olisthopus glabricollis* Germ.).
Agonum marginatum L.: Anticristo, p.c., VIII;
Agonum viridicupreum Goeze: MAGISTRETTI, 1969: 213; Terranova P., c., V;
Agonum muelleri ssp. *unicolor* Leoni: MAGISTRETTI, 1955 a: 27; Colle del Dragone, 1 ex., VII.
Anchus ruficornis Goeze *: Duglia, 1 ex., VIII; Anticristo, r., VIII.
Anchomenus dorsalis Pont.: MAGISTRETTI, 1955 a: 27.
Lebia cyanocephala L.: MAGISTRETTI, 1955 a: 27; Fosso Mauro, 1 ex., VI;
Lebia humeralis Dej.: MAGISTRETTI, 1955 a: 27; Piano Ruggio, r., VI;
Lebia cruxminor ssp. *nigripes* Dej.: MAGISTRETTI, 1955 a: 27; Timpa del Demonio, 1 ex., VI; Fosso Mauro, 1 ex., VI; Anticristo, r., VII;
Lebia trimaculata Vill.*: Duglia, r., VIII; Fosso Mauro, p.c., VI;
Lebia marginata Fourcr.: MAGISTRETTI, 1955 a: 28; Piano Toscano, 1 ex., VI; Valle Malvento, 1 ex., VI; Vacquaro, c., VI;
Lebia scapularis Fourcr.: Terranova P., 1 ex., VI.
Demetrias atricapillus L.: Piano Ruggio, c., VI-VII; Campotenese, 1 ex., VII.
Dromius linearis Ol.: MAGISTRETTI, 1955 a: 28;
Dromius agilis F.: GOBBI, 1973: 34; (M);
Dromius quadrimaculatus L.*: Duglia, 1 ex., IX; Campotenese, c., VII; (M).
Philorhizus quadrisignatus Dej.: Campotenese, r., VII;
Philorhizus melanocephalus Dej.: MAGISTRETTI, 1955 a: 28; Campotenese, r., VII;
Philorhizus crucifer Luc.: Duglia, 1 ex., VIII; Anticristo, 1 ex., VI.
Microlestes maurus Sturm *: Duglia, r., VIII.
Lionychus quadrillum Duft.: MAGISTRETTI, 1955 a: 28.
Cymindis axillaris ssp. *distinguenda* Chaud.: MAGISTRETTI, 1955 a: 28 (sub *C. axillaris* F.); Colle del Dragone, 1 ex., VI;

Cymindis scapularis ssp. *etrusca* Bassi: MAGISTRETTI, 1955 a: 29; Terranova P., 1 ex., VI; Pedarreto, 1 ex., VII.
Brachynus sclopeta F.*: Piano Ruggio, 1 ex., VII;
Brachynus explodens Duft.: MAGISTRETTI, 1955 a: 29;
Brachynus crepitans L.: MAGISTRETTI, 1955 a: 29.
Clinidium canaliculatum Costa: GOBBI, 1973: 33; Duglia, p.c., VI-VII.

HALIPLIDAE

Haliplus obliquus F.: L. Ricciardule, r., VI;
Haliplus ruficollis Deg.: ANGELINI, 1978: 75; L. Ricciardule, c., VI-VII.

HYGROBIIDAE

Hygrobia tarda Herbst: Terranova P., r., VI.

DYTISCIDAE

Bidessus minutissimus Germ.: Terranova P., c., VI; Anticristo, r., VI.
Guignotus pusillus F.: SANFILIPPO, 1955: 1; Campotenese, c., VI-VII.
Hygrotus inaequalis F.: ANGELINI, 1978: 115; Duglia, r., VII; L. Ricciardule, c., VII; Piano Ruggio, c., VIII; Anticristo, r., VI.
Hydroporus pubescens Gyll.: BERTRAND, 1956: 6; L. Ricciardule, p.c., VII; Anticristo, r., VI-VII;
Hydroporus pubescens ssp. *habelmanni* Wehn.: SANFILIPPO, 1955: 2;
Hydroporus planus F.: ANGELINI, 1982: 62; Terranova P., r., VI; L. Ricciardule, r., VII;
Hydroporus discretus Fairm.: SANFILIPPO, 1955: 2; Piano Pollino, p.c., VII; Anticristo, r., VII;
Hydroporus analis Aubé: ANGELINI, 1978: 85;
Hydroporus palustris L.: FOCARILE, 1960 a: 68; L. Ricciardule, c., VI-IX; Duglia, c., VI-VII;
Hydroporus tessellatus Drap.: SANFILIPPO, 1955: 2; BERTRAND, 1956: 2; Duglia, r., VI; Piano Pollino, r., VII;

Hydroporus nigrita F.: Terranova P., p.c., VI; Piano Pollino, r., VII;
Hydroporus obsoletus Aubé: SANFILIPPO, 1955: 2; BERTRAND, 1956: 3; Terranova P., r., VI;
Hydroporus memnonius Nicol.: SANFILIPPO, 1955: 2; L. Ricciardule, c., VII; Piano Pollino, r., VII; Vacquarro, c., VI.
Graptodytes varius Aubé: ANGELINI, 1982: 71; Terranova P., 1 ex., VII; L. Ricciardule, 1 ex., VII;
Graptodytes concinnus Steph.: ANGELINI, 1978: 115 (sub *G. flavipes* Ol.); L. Ricciardule, r., VII; Campotenese, c., VI-VII.
Porhydrus lineatus F.: ANGELINI, 1978: 88; L. Ricciardule, r., VII.
Scarodytes halensis F.: BERTRAND, 1956: 3;
Scarodytes ruffoi Franc.: ANGELINI, 1978: 89; Duglia, r., VII.
Deronectes delarouzei Duv.: ANGELINI, 1978: 96; Duglia, r., VII; Cugno Acero, 1 ex., VIII; Vacquarro, r., VI;
Deronectes moestus Fairm.: BERTRAND, 1956: 3.
Potamonectes griseostriatus Deg.: ANGELINI, 1978: 97; Duglia, r., VII;
Potamonectes sansi Aubé: BERTRAND, 1956: 3.
Noterus clavicornis Deg.: L. Ricciardule, c., VI-VII; L. Fondo, p.c., VI.
Laccophilus minutus L.: SANFILIPPO, 1955: 1; L. Ricciardule, r., VII; Piano Pollino, r., VII; Vacquarro, c., VI-VII.
Agabus didymus Ol.: SANFILIPPO, 1955: 3; BERTRAND, 1956: 5; L. Ricciardule, c., VII; Vacquarro, c., VI;
Agabus biguttatus Ol.: SANFILIPPO, 1955: 3; BERTRAND, 1956: 4; Duglia, c., VI-VII; Vacquarro, c., VI-VII;
Agabus biguttatus f. *nitidus* F.: SANFILIPPO, 1955: 3;
Agabus guttatus Payk.: ANGELINI, 1978: 101; Duglia, r., VII;
Agabus bipustulatus L.: SANFILIPPO, 1955: 3; BERTRAND, 1956: 4; L. Ricciardule, p.c., VII;
Agabus paludosus F.: L. Ricciardule, r., VI;
Agabus nebulosus Först.: SANFILIPPO, 1955: 3;
Agabus chalconotus Panz.: ANGELINI, 1978: 102; L. Ricciardule, c., VII.
Ilybius ater Deg.: ANGELINI, 1978: 103; L. Ricciardule, 1 ex., VII;
Ilybius fuliginosus F.: Lago Ricciardule, r., VI.
Colymbetes fuscus L.: Terranova P., p.c., VI.
Acilius sulcatus L.: SANFILIPPO, 1955: 3.
Dytiscus marginalis L.: ANGELINI, 1978: 115; L. Ricciardule, r., VII; Duglia, 1 ex., VI.

GYRINIDAE

Aulonogyrus striatus F.: SANFILIPPO, 1955: 4.
Gyrinus substriatus Steph.: SANFILIPPO, 1955: 4; BERTRAND, 1956: 5; L. Ricciardule, p.c., VII; Vacquarro, r., VI-VII.

HYDROPHILIDAE

Anacaena bipustulata Marsh.: Fontana di Rummo, r., V; Valle della Caballa, r., VI;
Anacaena globulus Payk.: Duglia, r., V-IX; Vacquarro, 1 ex., VI; Valle della Caballa, p.c., VI;
Anacaena limbata F.: Lago Fondo, r., VI.
Berosus signaticollis Sharp: Lago Ricciardule, r., V-VII; Lago Fonfo, r., VI.
Cercyon haemorrhoidalis F.: Vacquarro, c., VI-IX; Colle Gaudolino, 1 ex., VI; Piano Ruggio, c., V-X;
Cercyon quisquilius L.*: Piano Pollino, r., VII; Piano Zaperna, c., V-VII;
Cercyon unipunctatus L.*: Vacquarro, c., VI-VIII; Colle Gaudolino, 1 ex., VII.
Coelostoma orbiculare F.: Piano Zaperna, p.c., VI.
Cryptopleurum minutum F.: Timpa del Demonio, c., VII; Cozzo di Visitone, c., VII.
Elophorus aquaticus ssp. *italus* Kuw.: Piano Ruggio, p.c., VI;
Elophorus asperatus Rey: CHIESA, 1959: 96; (M);
Elophorus brevipalpis Bed.: Piano Zaperna, 1 ex., VII;
Elophorus discrepans Rey: CHIESA, 1959: 98; (M);
Elophorus erichsoni Bach.: CHIESA, 1959: 102;
Elophorus glacialis Villa: CHIESA, 1959: 86; (M);
Elophorus granularis Er.: Valloncello di Viggianello, r., VII;
Elophorus maritimus Rey: Lago Ricciardule, c., V-VIII; Lago Fondo, r., VI-VII; Piano Pollino, c., VI;
Elophorus minutus F.*: Duglia, c., VI; Lago Ricciardule, c., VI;
Elophorus rufipes Bosch.: CHIESA, 1959: 79;
Elophorus viridicollis Steph.: Piano Pollino, r., VII; Piano Ruggio, c., V-VII; Pedarreto, r., VI.
Helochares lividus Först.: Vacquarro, c., V-X.
Hydraena devillei Ganglb.**: Vacquarro, c., VI-VII; Valle della Caballa, 1 ex., VI; nota di Liguria, Piemonte, Emilia, Toscana, I. Elba (CHIESA, 1959: 65);

Hydraena imperatrix Knisch.: CHIESA, 1959: 41;
Hydraena riparia Kug.*: Duglia, p.c., VII; Lago Ricciardule, r., V-VII;
Hydraena truncata ssp. *falzonii* Pretner: CHIESA, 1959: 57.
Hydrobius fuscipes L.: Vacquarro, c., V-VIII.
Hydrochus angustatus ssp. *flavipennis* Küst.: Piano Pollino, 1 ex., VII;
Hydrochus grandicollis Kiesw.: Lago Fondo, r., V-VII.
Laccobius obscuratus Rottbg.: GENTILI & CHIESA, 1975: 139;
Laccobius neapolitanus Rottbg.: GENTILI & CHIESA, 1975: 146.
Limnebius furcatus Baudi: Valle della Caballa, 1 ex., VI;
Limnebius nitiduloides Baudi *: Fontana di Rummo, r., V-VII; Valloncello di Viggianello, r., VI;
Limnebius papposus Muls.*: Lago Ricciardule, c., V-VI; Lago Fondo, c., VI.
Megasternum boletophagum Marsh.*: Piano Toscano, r., VI.
Ochtebius difficilis Muls.*: Duglia, r., V-VI; Piano Ruggio, r., VI;
Ochtebius ragusai Kuw.: Duglia, 1 ex., VI.
Philydrus quadripunctatus Herbst: Valloncello di Viggianello, 1 ex., X.
Sphaeridium bipustulatum F.: Colle Gaudolino, c., VI-VII; Piano Ruggio, c., VI-VIII;
Sphaeridium scarabaeoides L.: Vacquarro, c., V-VIII;
Sphaeridium substriatum Fald.: Piano Zaperna, r., VI; Piano Ruggio, c., VI-VII.

HISTERIDAE

Plegaderus dissectus Er.: VIENNA, 1980: 80; Vacquarro, 1 ex., VI.
Abraeus granulum Er.*: Valle Malvento, 1 ex., VIII;
Abraeus globosus Hoffm.: Coppola di Paola, versante sud, p.c., VII.
Saprinus detersus Ill.: VIENNA, 1980: 138; Piano Ruggio, 1 ex., VI;
Saprinus semistriatus Scriba: MÜLLER, 1955: 1;
Saprinus subnitescens Bickh.: VIENNA, 1971: 255; probabilmente vanno riferiti a questa specie gli exx. citati da MÜLLER (l.c.) sub *S. semistriatus* Scriba;
Saprinus furvus Er.: MÜLLER, 1955: 1; Terranova P., r., VI;
Saprinus acuminatus F.: MÜLLER, 1955: 2 (sub *S. subnitidus* Marsh.);
Saprinus tenuistrius ssp. *sparsutus* Solsky: MÜLLER, 1955: 2.
Saprinus calatravensis Fuente: MÜLLER, 1955: 2 (sub *S. angoranus* Bickh.);
Saprinus politus Brahm.: MÜLLER, 1955: 3; Vacquarro, r., VII;
Saprinus veris. *immundus* Gyll.: MÜLLER, 1955: 3;

Saprinus incognitus Dahl.: VIENNA, 1971: 279; Piano Ruggio, 1 ex., VII.
Kissister minimus Aubé: Duglia, r., V; Piano delle Mandre, r., VI.
Carcinops pumilio Er.: Piano Ruggio, r., VII.
Platylomalus complanatus Panz.: Duglia, r., VII.
Paromalus flavicornis Herbst: MÜLLER, 1955: 3; Colle dell'Impiso, c., VI; Valle Malvento, c., VIII;
Paromalus parallelepipedus Herbst: VIENNA, 1980: 227; Terranova, P., r., IX.
Epierus comptus Ill.: Duglia, r., IX; Pantano Grande, 1 ex., VI;
Epierus italicus Payk.: Coppola di Paola, pendici nord-est, p.c., VI-VII.
Onthophilus striatus Först.: Duglia, r., V-VII; Cugno Ruggeri, 1 ex., VI.
Pachylister inaequalis Ol.: MÜLLER, 1955: 4 (sub *Hister inaequalis* Ol.); Vacquarro, r., VII.
Hister quadrimaculatus L.: MÜLLER, 1955: 5; Piano Ruggio, r., VI-VII;
Hister teter Truqui *: Piano Ruggio, 1 ex., VII;
Hister uncinatus Ill.: MÜLLER, 1955: 5; Vacquarro, c., VI; Colle Gaudolino, r., VII.
Margarinotus succicola Thoms.: MÜLLER, 1955: 5 (sub *Hister striola* Sahlb.);
Margarinotus purpurascens Herbst: strada Terranova P.-Duglia, r., VI;
Margarinotus neglectus Germ.: MÜLLER, 1955: 6 (sub *Hister neglectus* Germ.); Duglia, r., VII, *leg.* MONTEMURRO;
Margarinotus ventralis Marsh.: MÜLLER, 1955: 6 (sub *Hister ventralis* Marsh.);
Margarinotus ignobilis Marsh.*: Campotenese, 1 ex., VI; (M);
Margarinotus stigmosus Marsh.*: Campotenese, 1 ex., VI.
Atholus duodecimstriatus Schrnk.: MÜLLER, 1955: 6 (sub *Hister duodecimstriatus* Schrnk.).
Platysoma frontale Payk.: MÜLLER, 1955: 4; Coppola di Paola, r., VII;
Platysoma compressum Herbst: MÜLLER, 1955: 4.
Cylister oblongus F.: Anticristo, 1 ex., VII; Campotenese, r., VI-VII.
Hetaerius ferrugineus Ol.: Campotenese, 1 ex., VII.

SILPHIDAE

Ablattaria laevigata F.: TAMANINI, 1955: 18; Terranova P., r., VI-VII.
Aclypea undata Müll.*: Duglia, 1 ex., VII; Colle del Dragone, 1 ex., VII.
Necrophorus interruptus Steph.: TAMANINI, 1955: 17; Coppola di Paola, pendici nord-est, m.c., VII.
Silpha olivieri Bedel: TAMANINI, 1955: 18; Valloncello di Viggianello, 1 ex., VI;

Silpha tristis Ill.: TAMANINI, 1955: 18.
Thanatophilus rugosus ssp. *tubercolosus* Dep.: TAMANINI, 1955: 18; Coppola di Paola, pendici nord-est, c., VI-VII; Colle del Dragone, c., VII.
Xylodrepa quadripunctata Schreb.*: Duglia, r., VI; Campoterese, r., VI.

LEPTINIDAE

Leptinus testaceus Müll.: Piano Ruggio, r., VII; vaglio in nido di topo sotto un tronco abbattuto.

CATOPIDAE

Anemadus strigosus ssp. *pollinensis* Tam.: TAMANINI, 1955: 1; Colle del Dragone, r., VII; Valle Malvento, c., VI; (E).
Bathysciola (Salfia) *ruffoi* Tam.: TAMANINI, 1955: 6; (E).
Catops fuliginosus f. *inermis* Jeannel: TAMANINI, 1955: 4; Valle Malvento, c., VI; Coppola di Paola, pendici nord-est, 1 ex., VII;
Catops kirbyi Spence *: Vacquarro, 1 ex., VII; noto di Trentino A. Adige, Toscana, Lazio, Abruzzo (LUIGIONI, 1929: 334);
Catops nigricans Spence: Colle del Dragone, r., VI;
Catops tristis Panz.*: Piano Ruggio, 1 ex., VII; (M).
Choleva cisteloides Fröl.: TAMANINI, 1955: 4; Serra del Prete, pendici ovest, 1 ex., VI.
Nargus badius Sturm: Colle Gaudolino, c., VII; Valle Malvento, 1 ex., VIII; Piano Ruggio, c., V-VIII; Coppola di Paola, pendici sud, c., VII; Colle del Dragone, p.c., V-VII;
Nargus velox Spence: Serra del Prete, pendici nord-est, r., VI-VIII; Valle Malvento, r., VIII; Colle del Dragone, c., V-VIII;
Nargus wilkini Spence *: Vacquarro, 1 ex., VI; Piano Ruggio, p.c., VI-VIII.
Sciodrepoides watsoni Spence: Fontana Rummo, 1 ex., VII.

COLONIDAE

Colon griseum Czwal.: TAMANINI, 1955: 11.

LEIODIDAE

Agaricophagus cephalotes Schmidt: Duglia, 1 ex., VIII; Coppola di Paola, pendici nord-est, 1 ex., VII; (M).

Leiodes badia Sturm: Piano Ruggio, 1 ex., VI;
Leiodes longipes Schmidt *: Piano Ruggio, r., VI; LUIGIONI (1929: 344) lo cita del Veneto sub *L. curta* Fairm.; (M);
Leiodes polita Marsh.: Piano Ruggio, 1 ex., VIII.
Anisotoma castanea Herbst *: Duglia, r., VI; Colle del Dragone, p.c., VII;
Anisotoma glabra F.: TAMANINI, 1955: 12; Colle del Dragone, r., VII;
Anisotoma humeralis F.* Duglia, p.c., VI;
Anisotoma orbicularis Herbst *: Duglia, c., VI; Piano Ruggio, p.c., VII.
Amphycillis globus F.: TAMANINI, 1955: 12; Piano Ruggio, r., VI-VII.
Agathidium badium Er.: Vacquarro, c., VIII; Piano Ruggio, c., VI-VII;
Agathidium italicum Hlisn.*: Duglia, 1 ex., IX; Vacquarro, p.c., VI-VII; Piano Ruggio, c., VII-VIII; (M);
Agathidium mandibulare Sturm *: Duglia, p.c., IX; Cugno Ruggeri, r., VII; Colle Gaudolino, r., VII; Piano Ruggio, ec., VII;
Agathidium marginatum Sturm *: Valle Malvento, 1 ex., VI; noto di App. Ligure, Piemonte, Trentino A. Adige (LUIGIONI, 1929: 347);
Agathidium montemurroi Ang. & Dmz.***: Duglia, r., IX; specie nuova per la scienza descritta su exx. del Pollino e di altre località italiane ed estere (ANGELINI & DE MARZO, 1985: 172);
Agathidium nigrinum Sturm *: Piano Ruggio, p.c., VI;
Agathidium nigripenne F.: Coppola di Paola, pendici nord-est, p.c., VI-VII;
Agathidium nudum Hampe: M. Pollino, 1 ex., VII, coll. Mus. Milano;
Agathidium obenbergeri Hlisn.: Vacquarro, c., VI; Colle Gaudolino, p.c., VII; Colle del Dragone, p.c., VI;
Agathidium pisanum Bris.: SCHATZMAYR, 1943: 96; Terranova P., c., V-VII; Piano Ruggio, c., VI-VII; Coppola di Paola, pendici nord-est, c., VIII; Colle del Dragone, r., VI-VII;
Agathidium plagiatum Gyll.: Duglia, p.c., IV;
Agathidium rotundatum ssp. *paganettii* Reitt.*: Valle Malvento, c., VIII; Piano Ruggio, c., VII-VIII;
Agathidium seminulum L.*: Duglia, c., VIII; Timpa del Demonio, p.c., VI.

CLAMBIDAE

Clambus pallidulus Reitt.*: Colle Gaudolino, r., VII; Piano Ruggio, r., VI; LUIGIONI (1929: 349) lo segnala di Sardegna, ENDRÖDY-YOUNGA (1960: 278) anche di I. Elba, Toscana, Calabria, Sicilia.
Loricaster testaceus ssp. *pumilus* Reitt.*: Valle Malvento, r., VI; Piano Ruggio, c., VI-VIII.

SCYDMAENIDAE

Cephennium apicale Reitt.*: Piano Ruggio, 1 ex., VII.
Euthicomus conicicollis Fairm.*: Serra del Prete, pendici nord-est, 1 ex., VII; noto nel Lazio (LUIGIONI, 1929: 316); (M).
Mastigus heydeni Rottbg.: BORDONI & CASTELLINI, 1973: 312; Terranova P., r., VI-VII;
Mastigus pilifer Kr.: BORDONI & CASTELLINI, 1973: 314; Terranova Pollino, c., V-IX.
Microscydmus nanus Shaum *: Terranova P., 1 ex., VII; (M).
Neuraphes angulatus Müll. & Kunze **: Piano Ruggio, 1 ex., VII; noto di Piemonte, Veneto, Emilia, Toscana, Umbria (LUIGIONI, 1929: 319);
Neuraphes planiceps Reitt.*: Colle del Dragone, 1 ex., VI.
Scydmaenus hellwigi Herbst: Coppola di Paola, pendici nord-est, c., VII.
Stenichnus egregius Holdh.*: Piano Ruggio, 1 ex., VI, *leg.* MONTEMURRO.

CORYLOPHIDAE

Sacium nanum Muls.*: Campotenese, 1 ex., VII.
Sericoderus revelierei Reitt.*: Campotenese, p.c., VI-VII.

PTILIIDAE

Acrotrichis montandoni Allib.: Duglia, 1 ex., VIII;
Acrotrichis sitkaensis Motsch. (= *fratercula* auct.) ***: Terranova P., 1 ex., 16.VI.1985; specie nuova per la fauna italiana; SUNDT (in *Die Käfer Mitt.*, 1971: 342) ne definisce « poco chiara » (Verbreitung noch unklar) la diffusione in Europa, sub *fratercula* Rossk.); (M).
Ptenidium laevigatum Er.: Duglia, c., VIII; Vacquarro, c., VI; Valle Malvento, r., VI; Piano Ruggio, c., VI-VII;
Ptenidium turgidum Thoms.: Duglia, c., VIII; LUIGIONI (1929: 1016) lo inserisce nel capitolo « specie dubbie »; ANGELINI & MONTEMURRO (1986: in stampa) lo indicano di Policoro; (M).
Pterix suturalis Heer *: Piano Ruggio, 1 ex., VII.
Ptiliolum marginatum Aubé **: Terranova P., 1 ex., VII; noto di Liguria, Piemonte e Sicilia (LUIGIONI, 1929: 352);

Ptiliolum schwarzi Flach **: Terranova P., 1 ex., VII; noto di Piemonte, Toscana e Lazio (LUIGIONI, 1929: 353); (M).

SCAPHIDIIDAE

Scaphidium quadrimaculatum Ol.: TAMANINI, 1955: 12; Coppola di Paola, pendici sud, r., VI-VII.
Scaphium immaculatum Ol.: Acqua Tremola, r., VI.
Scaphosoma boleti Panz.: Piano Ruggio, 1 ex., VII; (M);
Scaphosoma boreale Lundbl.: LOBL, 1970: 774;
Scaphosoma italicum Tam.: TAMANINI, 1955: 15; Terranova P., c., V-IX; Duglia, r., IX; Vacquarro, c., VI-VIII; Valle Malvento, c., VI-VIII; Piano Ruggio, c., V-VIII; Anticristo, c., VI-VII;
Scaphosoma subalpinum Reitt.: TAMANINI, 1955: 13; Piano Ruggio, 1 ex., VII.

STAPHYLINIDAE

Acrolocha amabilis Heer: ZANETTI, 1978: 548; Duglia, r., IX; (M).
Acrotona sordida Marsh.: Valle Malvento, 1 ex., VII.
Aleochara albovillosa Bernh.: Colle Gaudolino, 1 ex., VII;
Aleochara bipustulata L.: GRIDELLI, 1956 a: 29; Anticristo, r., VII;
Aleochara curtula Goeze: Colle Gaudolino, r., VII;
Aleochara intricata Mannh.: GRIDELLI, 1956 a: 29; Coppola di Paola, pendici sud, r., VII;
Aleochara ripicola Rey *: Duglia, 1 ex., VII;
Aleochara sparsa Heer *: Piano Ruggio, 1 ex., VII;
Aleochara tristis Gravh.: GRIDELLI, 1956 a: 29.
Amphicroum canaliculatum Er.: GRIDELLI, 1956 a: 6 (sub *A. albanicum* Bernh. sensu SCHEERPELTZ).
Anotylus inustus Gravh.: GRIDELLI, 1956 a: 8 (sub *Oxytelus inustus* Gravh.); Piano Ruggio, r., VII-VIII;
Anotylus nitidulus Gravh.: Colle del Dragone, 1 ex., VI;
Anotylus rugosus F.: Duglia, r., VIII;
Anotylus sculpturatus Gravh.: GRIDELLI, 1956 a: 8 (sub *Oxytelus sculpturatus* Gravh.).
Anthophagus alpestris ssp. *kochi* Bern.**: Vallone Zaperna, 2 exx., VI; Valle Malvento, 2 exx., VI; Piano Ruggio, 1 ex., VI; (M);

Anthophagus bicornis Block: KOCH, 1934: 146;
Anthophagus fauveli ssp. *caprai* Koch: GRIDELLI, 1956 a: 8; Duglia, 1 ex., VIII; Piano Ruggio, r., VI;
Anthophagus torretassoi ssp. *pollinensis* Koch: KOCH, 1934: 188; GRIDELLI, 1956 a: 7; Vacquarro, p.c., VI; Valle Malvento, r., VI; Piano Ruggio, c., VI; Coppola di Paola, pendici sud-est, r., I; Anticristo, 1 ex., VI; (E).
Arpedium platyophthalmum Koch: KOCH, 1937: 84; (E).
Astilbus italicus Bernh.: GRIDELLI, 1956 a: 28.
Atheta britanniae S.B.: Valle Malvento, 1 ex., VIII;
Atheta castanoptera Mannh.: GRIDELLI, 1956 a: 26;
Atheta fulvipennis Muls. & Rey: GRIDELLI, 1956 a: 26;
Atheta hygrotopora Kr.: SCHEERPELTZ, 1956: 24; GRIDELLI, 1956 a: 26 (sub *Atheta salfii* Scheerp.);
Atheta leonhardi Bernh.: GRIDELLI, 1956 a: 27;
Atheta longiuscula Gravh.: GRIDELLI, 1956 a: 27;
Atheta pallidicornis Thoms.: Valle Malvento, 1 ex., VIII;
Atheta pollinensis Scheerp.: SCHEERPELTZ, 1956: 26; GRIDELLI, 1956 a: 27; (E);
Atheta rey Kiesw.: GRIDELLI, 1956 a: 27;
Atheta sulcifrons Steph.: GRIDELLI, 1956 a: 26.
Autalia ? impressa Ol.: Pantano Grande, 1 ex., VI.
Baptolinus affinis Payk.: BAUDI, PICCIOLI & CAVANNA, 1882: 68; GRIDELLI, 1956 a: 11; molto comune ovunque, sotto cortecce, IV-X.
Bledius fossor Er.: Campotenese, 1 ex., VII.
Bolitobius exoletus Er.: Duglia, p.c., IX;
Bolitobius lunulatus L.: GRIDELLI, 1956 a: 22; Duglia, r., IX; Valle Malvento, c., VIII;
Bolitobius thoracicus F.: Cugno Ruggeri, r., VI-VIII.
Bolitochara lucida Gravh.: GRIDELLI, 1956 a: 25; Valle Malvento, 1 ex., VIII;
Bolitochara obliqua Er.: GRIDELLI, 1956 a: 25; Valle Malvento, c., VIII.
Bryocharis inclinans Gravh.**: Valle Malvento, 1 ex., VI; noto di A. Marittime, App. Emiliano e Toscano, Lazio (LUIGIONI, 1929: 245).
Bryoporus rufus Er.: GRIDELLI, 1956 a: 22; Piano Ruggio, r., VI.
Caloderina hierosolymitana Saulcy: GRIDELLI, 1956 a: 24.
Crataraea suturalis Mannh.*: Cozzo di Visitone, r., VI.
Creophilus maxillosus L.: GRIDELLI, 1956 a: 18; Terranova P., 1 ex., VI.
Deleaster dichrous Gravh.: GRIDELLI, 1956 a: 8; Duglia, r., VIII, *leg.* DE MARZO.
Deliphrosoma platyophthalmum Koch: KOCH, 1937: 233; GRIDELLI, 1956 a:

6 (sub *Arpedium platyophthalmum* Koch); ZANETTI, 1978: 175-181; (M).
Euryusa optabilis Heer *: Acqua Tremola, r., VI.
Eusphalerum bargaglii Luze: GRIDELLI, 1956 a: 4 (sub *Anthobium sorbi* Gyll.); ZANETTI, 1982: 124; Vallone Zaperna, 1 ex., VI; (M);
Eusphalerum baudii Fiori: GRIDELLI, 1956 a: 3 (sub *Anthobium baudii* Fiori); Piano Ruggio, p.c., VI; Anticristo, r., VI;
Eusphalerum bivittatum Epp.**: Piano Ruggio, 1 ex., VII;
Eusphalerum cribellum Fauv.: GRIDELLI, 1956 a: 4 (sub *Antobium cribellum* Fauv.);
Eusphalerum rectangulum Fauv.*: Valle Malvento, 1 ex., VI;
Eusphalerum ruffoi Scheerp.: SCHEERPELTZ, 1956: 3; GRIDELLI, 1956 a: 4 (sub *Anthobium ruffoi* Scheerp.); ZANETTI, 1982: 134; Duglia, 1 ex., V, *leg.* MONTEMURRO; Piano Ruggio, 1 ex., VI; (M);
Eusphalerum schatzmayri Koch: KOCH, 1938: 138; GRIDELLI, 1956 a: 5 (sub *Anthobium schatzmayri* Koch); SCHEERPELTZ (1956) e GRIDELLI (1956 a: 5) citano questa specie anche sub *Anthobium alutaceum* Scheerp.; (E);
Eusphalerum signatum ssp. *angulatum* Luze: GRIDELLI, 1956 a: 4 (sub *Anthobium signatum* Märk.); ZANETTI, 1982: 136; Vacquarro, r., VI; Piano Ruggio, 1 ex., VI;
Eusphalerum stussineri Bernh.: ZANETTI, 1982: 131; Vacquarro, r., VI; Valle Malvento, 1 ex., VI; Piano Ruggio, r., VI.
Gabruis doderoi Grid.: Duglia, r., VIII;
Gabrius nigritulus Gravh.: GRIDELLI, 1956 a: 15; Duglia, 1 ex., VIII;
Gabrius sexualis Smet.: PORTA, 1959: 79 (sec. GRIDELL), 1956 a: 15, nota 1, potrebbe trattarsi del *G. pennatus* Sharp); (M);
Gabrius splendidulus Gravh.: SMETANA, 1954: 40; GRIDELLI, 1956 a: 15.
Gyrohypnus angustatus Steph.: Pedarreto, 1 ex., VII;
Gyrohypnus fracticornis Müll.: Pantano Grande, r., VI;
Gyrohypnus punctulatus Payk.: GRIDELLI, 1956 a: 11.
Gyrophaena congrua Er.: GRIDELLI, 1956 a: 24.
Habrocerus capillaricornis Gravh.: Madonna di Pollino, p.c., VII; Piano Ruggio, r., VI-VII; Coppola di Paola, pendici sud, r., VI.
Hetethops ? dissimilis Gravh.: Campotenese, 1 ex., VI.
Lathrimaeum atrocephalum Gyll.*: Piano Pollino, 1 ex., VIII, *leg.* DE MARZO;
Lathrimaeum melanocephalum Ill.: Vacquarro, r., VI.
Lathrobium multipunctum Gravh.: GRIDELLI, 1956 a: 10; Duglia, r., IX; Colle dell'Impiso, r., VI.
Leptusa kochiana Bernh.: BERNHAUER, 1936: 245; GRIDELLI, 1956 a: 24; (E);
Leptusa pollinensis Pace: PACE, 1977: 161; (E);

Leptusa pulchella Mannh.: GRIDELLI, 1956 a: 24; Vacquarro, 1 ex., VI; Coppola di Paola, pendici nord-est, 1 ex., VII.

Lesteva luctuosa Fauv.: GRIDELLI, 1956 a: 7 (sub *Lesteva graeca* Scheerp. sensu SCHEERPELTZ);

Lesteva monticola Kiesw.: Vacquarro, r., VI; Vallone Zaperna, r., VI

Leucoparyphus silphoides L.: Campotenese, 1 ex., VI.

Liogluta nitidula Kr.*: Valle Malvento, 1 ex., VI; (M).

Medon apicalis Kr.: Coppola di Paola, pendici nord-est, 1 ex., VII.

Meotica exilis Er.: GRIDELLI, 1956 a: 28.

Metopsia clipeata Müll.: Duglia, p.c., VIII, *leg.* DE MARZO.

Micropeplus latus Hampe ***: Duglia, 1 ex., VIII, *leg.* DE MARZO; specie nuova per la fauna italiana.

Mycetoporus brucki Pand.: GRIDELLI, 1956 a: 21;

Mycetoporus ? longulus Mannh.**: Valle Malvento, 1 ex., VI; A. Marittime, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino A. Adige, Toscana (LUIGIONI, 1929: 241); (M);

Mycetoporus mulsanti Ganglb.: GRIDELLI, 1956 a: 21;

Mycetoporus pollinensis Scheerp.: SCHEERPELTZ, 1956: 16; GRIDELLI, 1956 a: 21; (E);

Mycetoporus punctus Gyll.: Piano Ruggio, 1 ex., VI;

Mycetoporus rufescens Steph.*: Valle Malvento, 1 ex., VIII.

Ocalea pollinensis Scheerp.: SCHEERPELTZ, 1956: 16; GRIDELLI, 1956 a: 28; (E).

Ocypus compressus Marsh.: GRIDELLI, 1956 a: 17; Campotenese, r., VI;

Ocypus confusus Baudi: GRIDELLI, 1956 a: 17;

Ocypus globulifer Geoffr.: Cugno dell'Acero, 1 ex., VII;

Ocypus italicus Arag.: BAUDI, PICCIOLI & CAVANNA, 1882: 68; GRIDELLI, 1956 a: 16 (sub *Staphylinus italicus* Arag.); Duglia, r., IX; Anticristo, 1 ex., VI;

Ocypus olens Müll.: Canale Malvento, r., VII; Colle del Dragone, p.c., VI-VII;

Ocypus ophthalmicus Scop.: GRIDELLI, 1956 a: 16 (sub *Staphylinus ophthalmicus* Scop.); Colle del Dragone, r., VI;

Ocypus picipennis aprutianus Müll.: GRIDELLI, 1956 a: 17;

Ocypus similis F.: GRIDELLI, 1956 a: 16 (sub *Staphylinus similis* F.); Terranova P., r., IX.

Omalium excavatum Steph.: GRIDELLI, 1956 a: 5; Vallone Zaperna, 1 ex., VI;

Omalium rivulare Payk.: Timpa del Demonio, 1 ex., VI.

Ontholestes murinus L.: GRIDELLI, 1956 a: 18; Duglia, c., VI-VIII; Vacquarro, c., VI-VII; Piano Ruggio, r., VI; Anticristo, p.c., VI.

Othius laeviusculus Steph.: Lago Fondo, 1 ex., VII; Valle Malvento, r., VI;
Othius lapidicola Steph.*: Valle Malvento, 1 ex., VIII; Coppola di Paola, pendici sud, r., VII.
Oxypoda alternans Gravh.: GRIDELLI, 1956 a: 29; Valle Malvento, c., VIII;
Oxypoda formosa Er.: GRIDELLI, 1956 a: 29;
Oxypoda lividipennis Mannh.: GRIDELLI, 1956 a: 28;
Oxypoda umbrata Gyll.: GRIDELLI, 1956 a: 28.
Oxyporus rufus L.: Piano Ruggio, 1 ex., VI.
Oxytelus piceus L.: Campotenese, r., VI.
Paederus baudii Fairm.*: Lago Ricciardule, 1 ex., VII;
Paederus rubrothoracicus Goeze: Duglia, p.c., VI-VII; Fontana Rummo, r., VI; Vacquarro, p.c., VI-VII; Valloncello di Viggianello, p.c., VII.
Phalacrolinus glaber Nordm.*: Coppola di Paola, pendici sud, r., VII.
Philonthus aeneus Rossi: BAUDI, PICCIOLI & CAVANNA, 1882: 68;
Philonthus atratus Gravh.: Duglia, 1 ex., VI;
Philonthus cognatus Steph.: SMETANA, 1954: 40; GRIDELLI, 1956 a: 13; (sub *P. fuscipennis* Mannh.); PACE & ZANETTI, 1977: 293; Valle Malvento, r., VIII; Piano Ruggio, c., VI; Fosso Mauro, r., VII;
Philonthus coprophilus Jarr.*: Cugno Ruggeri, 1 ex., VII;
Philonthus coruscus Gravh.: SMETANA, 1954: 40; GRIDELLI, 1956 a: 12; PACE & ZANETTI, 1977: 250;
Philonthus ebeninus Gravh.: BAUDI, PICCIOLI & CAVANNA, 1882: 68;
Philonthus decorus Gravh.: SMETANA, 1954: 40; PACE & ZANETTI, 1977: 292; Piano Ruggio, 1 ex., VI;
Philonthus fenestratus Fauv.*: Campotenese, 1 ex., VI;
Philonthus frigidus Kiesw.: GRIDELLI, 1956 a: 14; PACE & ZANETTI, 1977: 294; Vacquarro, 1 ex., VII;
Philonthus fumarius Gravh.: SMETANA, 1954: 40;
Philonthus intermedius Boisd. & Lac.: SMETANA, 1954: 40; GRIDELLI, 1956 a: 12; PACE & ZANETTI, 1977: 288; Serra del Prete, pendici ovest, r., VII;
Philonthus jurgans Tott.: GRIDELLI, 1956 a: 14; PACE & ZANETTI, 1977: 296; Campotenese, 1 ex., VII;
Philonthus laminatus Creutz.: Cugno dell'Acero, r., VII;
Philonthus nitidicollis Boisd. & Lac.: GRIDELLI, 1956 a: 14 (sub *P. concinnus* Gravh.); PACE & ZANETTI, 1977: 291; molto comune ovunque, V-X;
Philonthus ochropus Gravh.: PACE & ZANETTI, 1977: 291; Vallone Zaperna, r., VI;
Philonthus politus L.: Pedarreto, r., X;
Philonthus rectangulus Sharp: Anticristo, p.c., VI-VII; Campotenese, r., VI;
Philonthus rigidicornis Gravh.: SMETANA, 1954: 40; GRIDELLI, 1956 a: 15

(sub *P. fimetarius* Gravh.); PACE & ZANETTI, 1977: 296; Duglia, 1 ex., IX; Vallone Zaperna, r., VI;

Philonthus sordidus Gravh.: SMETANA, 1954: 40;

Philonthus varians Payk.: Cozzo di Visitone, 1 ex., X.

Phloeonomus pusillus Gravh.*: Cugno Ruggeri, 1 ex., VI.

Phloeopora angustiformis Baudi *: Anticristo, 1 ex., VI.

Phyllodrepa floralis Payk.: Vallone Zaperna, 1 ex., V; Valle Malvento, 1 ex., VI;

Phyllodrepa melanocephala ssp. *pollinensis* Scheerp.: SCHEERPELTZ, 1956: 8; GRIDELLI, 1956 a: 5; specie citata da tali Autori anche sub *Phyllodrepa rufotestacea* Scheerp.

Platystethus nitens Sahlb.: Vacquarro, r., VI; Piano Ruggio, 1 ex., VI.

Proteinus atomarius Er.: Duglia p.c., IX; Pantano Grande, r., VI;

Proteinus brachypterus F.: Duglia, c., IX; Cugno Ruggeri, r., IX; Lago Fondo, c., IX; Cugno dell'Acero, c., IX; Piano Ruggio, r., VII.

Pseudopsis sulcata Newm.*: Valle Malvento, 1 ex., VIII; Piano Ruggio, 1 ex., VIII.

Quedius abietum Kiesw.: Coppola di Paola, pendici nord-est, 1 ex., VII; Colle del Dragone, r., VII;

Quedius aspromontanus Bernh.: Campotenese, 1 ex., VI;

Quedius boops Gravh.: Valle Malvento, p.c., VIII;

Quedius bruttius Zan.: ZANETTI, 1977: 309; Duglia, 1 ex., VIII; Piano Ruggio, 1 ex., VII;

Quedius cinctus Payk.: BAUDI, PICCIOLI & CAVANNA, 1882: 67 (sub *Q. impressus* Panz.); GRIDELLI, 1956 a: 20; Pantano Grande, 1 ex., IX;

Quedius collaris italicus Grid.: GRIDELLI, 1956 a: 21; Vacquarro, 1 ex., VI;

Quedius cruentus Ol.: GRIDELLI, 1956 a: 19; Duglia, r., IX; Pendici sud-est di Serra delle Ciavole, 1 ex., VII; Valle Malvento, p.c., VI; Anticristo, r., VI-VII;

Quedius curtus Er.: GRIDELLI, 1956 a: 18;

Quedius dubius Heer *: Coppola di Paola, pendici nord-est, 1 ex., VI; noto di Alpi, App. Toscano e Abruzzese (LUIGIONI, 1929: 237);

Quedius fulgidus F.: BAUDI, PICCIOLI & CAVANNA, 1882: 67;

Quedius latialis Grid.*: Duglia, 1 ex., VI; Canale di Malevento, 1 ex., VII; Valle Malvento, 1 ex., VI;

Quedius latinus Grid.: GRIDELLI, 1956 a: 19; molto comune ovunque, V-IX;

Quedius mesomelinus silensis Fiori: GRIDELLI, 1956 a: 19 (sub *Q. mesomelinus* Marsh.); Duglia, c., IX; Piano Pollino, p.c., VIII;

Quedius nemoralis Baudi: GRIDELLI, 1956 a: 20; Colle Gaudolino, r., VII;

Timpa del Demonio, 1 ex., VI; Valle Malvento, 1 ex., VIII; Coppola di Paola, pendici nord-est, c., VI-VIII;

Quedius nigrocoeruleus Fauv.: Duglia, 1 ex., VIII; Colle dell'Impiso, r., VII; Piano Zaperna, r., VI;

Quedius oblitteratus Er.: Acqua Tremola, r., VI; Duglia, 1 ex., IX; Canale di Malevento, c., VI; Valle Malvento, r., VII; Piano Ruggio, c., VI;

Quedius obscuripennis Bernh.: GRIDELLI, 1956 a: 20; Vacquarro, p.c., IV; Valle Malvento, r., VIII; Anticristo, r., VIII; Campotenese, r., VII;

Quedius ochripennis Mén.: GRIDELLI, 1956 a: 19; Piano Pollino, r., VII; Valle Malvento, 1 ex., VI; Piano Ruggio, c., VI-VII; Pedarreto, c., VI;

Quedius ochropterus Er.: BAUDI, PICCIOLI & CAVANNA, 1882: 67; Piano Ruggio, r., VI;

Quedius paradisianus Heer *: Valle Malvento, 1 ex., VIII; (M);

Quedius picipes Mannh.: BAUDI, PICCIOLI & CAVANNA, 1882: 67;

Quedius scintillans Gravh.: Valloncello di Viggianello, 1 ex., VII;

Quedius semiaeneus Steph.: Colle Gaudolino, r., VII; Valle Malvento, 1 ex., VIII;

Quedius tristis Gravh.: BAUDI, PICCIOLI & CAVANNA, 1882: 67; GRIDELLI, 1956 a: 20;

Quedius ventralis Arag.*: Duglia, 1 ex., VIII.

Sepedophilus lusitanicum Ham.: Coppola di Paola, pendici nord-est, c., VII; Anticristo, r., VI-VII;

Sepedophilus bipustulatum Gravh.: Piano Ruggio, 1 ex., VI.

Sipalia focarilei Scheerp.: SCHEERPELTZ, 1956: 18; GRIDELLI, 1956 a: 26; (E);

Sipalia tamaninii Scheerp.: SCHEERPELTZ, 1956: 21; GRIDELLI, 1956 a: 26; (E).

Stenus aceris Steph.: GRIDELLI, 1956 a: 8; Campotenese, r., VI-VII;

Stenus asphaltinus Er.: Vacquarro, 1 ex., VI; Valle Malvento, r., VI;

Stenus assequens Rey: Vallone di Zaperna, 1 ex., VI;

Stenus binaghii Puthz: a questa specie vanno molto probabilmente riferiti gli exx. citati da KOCH (1937: 86) sub *S. ganglbaueri* Bernh.; GRIDELLI, (1956 a: 10) si limitò a riportare la citazione di KOCH;

Stenus caligicola Puthz: Duglia, r., VIII;

Stenus cordatus Gravh.: Duglia, c., IX; Pantano Grande, 1 ex., VI; Fontana Rummo, r., VII; Vacquarro, r., VI-VII; Valle Malvento, p.c., VI;

Stenus elegans Rosh.: Vallone Zaperna, c., VI; Valle Malvento, p.c., VI; Anticristo, r., VI-VII;

Stenus hospes Heer: GRIDELLI, 1956 a: 9; Lago Fondo, 1 ex., VI;

Stenus juno Payk.: Cugno Ruggeri, 1 ex., VII; Vacquarro, r., VI;

Stenus ochropus Kiesw.: Fontana Rummo, 1 ex., VII;
Stenus ossium Steph.*: Valle Malvento, 1 ex., VI;
Stenus picipes Steph.: GRIDELLI, 1956 a: 10; Vallone Zaperna, 1 ex., VI; Piano Ruggio, r., VI-VII; Campotenese, 1 ex., VII;
Stenus subaeneus Er.: GRIDELLI, 1956 a: 9; Duglia, r., VIII; Valle Malvento, c., VI; Coppola di Paola, pendici nord-est, 1 ex., VII; Anticristo, 1 ex., VI;
Stenus umbricus Baudi *: Piano delle Mandre, 1 ex., VI.
Tachinus humeralis Gravh.*: Duglia, c., IX; Pantano Grande, c., VI; Piano Toscano, r., VI; Madonna di Pollino, r., VI; Cozzo Dimoniello, Fosso Mauro, 1 ex., VII;
Tachinus marginellus F.: Canale di Malevento, 1 ex., VII;
Tachinus subterraneus L.: Serra delle Ciavole, pendici sud-est, 1 ex., VI; Piano Ruggio, 1 ex., VI.
Tachyporus chrysomelinus L.: Fontana Rummo, 1 ex., VII; Vacquarro, r., VI-VII; Vallone Zaperna, c., VI;
Tachyporus hypnorum F.: GRIDELLI, 1956 a: 23; Madonna di Pollino, 1 ex., VIII; Vallocello di Viggianello, r., VI; Piano Ruggio, 1 ex., VII;
Tachyporus macropterus Steph.: GRIDELLI, 1956 a: 22;
Tachyporus nitidulus F.: GRIDELLI, 1956 a: 22; molto comune ovunque, V-X;
Tachyporus solutus Er.: GRIDELLI, 1956 a: 23; Cugno dell'Acero, 1 ex., VII.
Tachyusa objecta Rey *: Campotenese, 1 ex., VII.
Trichophya pilicornis Gyll.*: Vallone Zaperna, 1 ex., VI.
Xantholinus apenninicola Steel.: GRIDELLI, 1956 a: 11 (sub *X. raffrayi* Dev.); Piano Toscano, 1 ex., VI;
Xantholinus jarrigei Coiff.: Colle del Dragone, 1 ex., VI.
Xylodromus affinis Gravh.: GRIDELLI, 1956 a: 6;
Xylodromus depressus Gravh.*: Piano Pollino, 1 ex., VIII, *leg.* DE MARZO.

PSELAPHIDAE

Batrisodes adnexus Hampe: Colle del Dragone, 1 ex., VII; Coppola di Paola, pendici nord-est, 1 ex., VII;
Batrisodes venustus Reichb.: POGGI, 1984: 90; Duglia, 1 ex., VIII; Piano Ruggio, 1 ex., VIII.
Biploporus bicolor ssp. *meridionalis* Megg.: MEGGIOLARO, 1966: 163;
Biploporus ultimus Guill.**: Duglia, r., VIII; noto di Corsica (LUIGIONI, 1929: 302); (M).
Brachygluta appennina Saulcy: MEGGIOLARO, 1960: 83;
Brachygluta helferi Schmd. & Goeb.: Piano Zaperna, c., VII; Valle Malvento, c., VI;

Brachygluta ragusae Saulcy: Duglia, 1 ex., VII;
Brachygluta schueppeli Aubé: Serra del Prete, pendici nord-est, 1 ex., VII; Coppola di Paola, pendici nord-est, 1 ex., VI.
Bryaxis curtisi ssp. *orientalis* Kar.*: Piano Ruggio, 1 ex., VI;
Bryaxis fiorianus Reitt.*: Piano Pollino, r., VII; Vacquarro, c., VI; Valle Malvento, c., VI; Colle del Dragone, r., VI;
Bryaxis italicus Baudi: Duglia, c., VIII; Pantano Grande, r., VI; Vacquarro, p.c., VII; Valle Malvento, c., VI;
Bryaxis paganettii Blattny: Duglia, c., VI-IX; Colle Gaudolino, r., VII; Valle Malvento, c., VI; Piano Ruggio, c., VI-VII;
Bryaxis pedator m. *calabricus* Reitt.: Vacquarro, 1 ex., VI; Timpa del Demonio, r., VII;
Bryaxis picteti ssp. *meridionalis* Mach.: Meggiolaro, 1960: 81 (sub *Arcopagus picteti* Tourn.); Duglia, r., IX; Cozzo di Visitone, r., VI.
Euplectus brunneus Grimm.: Duglia, p.c., VIII; Cugno Ruggeri, r., VI;
Euplectus karsteni Reichb.: Duglia, c., VIII; Coppola di Paola, pendici nord-est, r., VI-VIII; (M);
Euplectus kirbyi ssp. *hummleri* Reitt.: Vacquarro, c., VI; Colle Gaudolino, 1 ex., VII; Piano Ruggio, r., VII.

LYCIDAE

Lygistopterus anorachilus Rag.: Pardo-Alcaide, 1961: 2; Duglia, p.c., VI-VIII; Piano Ruggio, 1 ex., VII; Coppola di Paola, pendici sud, 1 ex., VII;
Lygistopterus sanguineus L.: Pardo-Alcaide, 1961: 1.
Platycis minuta F.: Gobbi, 1973: 36.
Pyropterus nigroruber Deg.: Serra Dolcedorme, pendici nord-ovest, c., VII; Piano Pollino, 1 ex., VIII; Piano Toscano, r., VI; Piano Ruggio, p.c., VIII; Coppola di Paola, pendici sud, 1 ex., VII.

LAMPYRIDAE

Phausis splendidula L.: Wittmer, 1935: 72.
Lampyris noctiluca v. *bellieri* Reiche: Wittmer, 1935: 72; Duglia, r., VI-VII.
Luciola italica L.: Wittmer, 1935: 72.

CANTHARIDAE

Cantharis decipiens Baudi *: Duglia, r., VI; Vacquarro, c., VI;

Cantharis falzonii Fiori: MOSCARDINI, 1968: 72; Valle Malvento, 1 ex., VI;
Cantharis fulvicollis F.: WITTMER, 1935: 74; MOSCARDINI, 1968: 66; Piano Toscano, 1 ex., VI;
Cantharis fusca L.: WITTMER, 1935: 72; MOSCARDINI, 1968: 55; Vacquarro, r., VI-VII; Colle dell'Impiso, r., VII;
Cantharis haemorrhoidalis F.: MOSCARDINI, 1968: 80; Duglia, p.c., VI; Timpa del Demonio, r., VI; Valle Malvento, c., VI-VII; Piano Ruggio, r., VI; Fosso Mauro, p.c., VI;
Cantharis italica Fiori: WITTMER, 1935: 72; MOSCARDINI, 1968: 71; Vacquarro, r., VI; Timpa del Demonio, 1 ex., VI-VII; Valle Malvento, p.c., VI; Piano Ruggio, c., VI; Coppola di Paola, pendici sud, 1 ex., VII;
Cantharis livida f. *sicula* Bourg.: Timpa del Demonio, c., VI; Vallone Zaperna, c., VI; Piano Ruggio, 1 ex., VI; Colle del Dragone, r., VI; Anticristo, r., VI;
Cantharis lucens Mosc.: WITTMER, 1935: 72 (sub *C. erichsoni* Bach); MOSCARDINI, 1968: 55;
Cantharis merula Mosc.: MOSCARDINI, 1968: 59; Madonna di Pollino, 1 ex., VI; Vacquarro, c., VI-VII; Piano Ruggio, r., VI;
Cantharis nigricans f. *immaculata* Schil.*: Cozzo di Visitone, 1 ex., VI; Piano Ruggio, r., VI;
Cantharis obscura ab. *morio* Baudi: WITTMER, 1935: 72;
Cantharis paganettii Flach.: Duglia, 1 ex., VI;
Cantharis pallida Goeze: MOSCARDINI, 1968: 79;
Cantharis pellucida f. *reuterbergi* Reitt.: Duglia, 1 ex., VI;
Cantharis peninsularis Fiori: Cugno dell'Acero, 1 ex., VI; Vacquarro, 1 ex., VI, *leg.* MONTEMURRO;
Cantharis rustica L.: MOSCARDINI, 1968: 56; Vallone Zaperna, r., VI; Timpa del Demonio, p.c., VI; Valle Malvento, c., VI-VII; Piano Ruggio, r., VI;
Cantharis torretassoi Wittm.: WITTMER, 1935: 72; MOSCARDINI, 1968: 80;
Cantharis violacea Payk.: MOSCARDINI, 1968: 53; Vacquarro, r., VI; Colle deldell'Impiso, 1 ex., VI.
Cratosilis denticollis Schumm.: Piano Ruggio, 1 ex., VII;
Cratosilis laeta f. *discolor* Baudi *: Piano Ruggio, c., VI;
Cratosilis sicula Marsh.: MOSCARDINI, 1968: 88; pendici sud-est di Serra delle Ciavole, 1 ex., VI; Piano Ruggio, r., VI.
Podabrus procerulus Kiesw.: Cozzo di Visitone, r., VI; Piano Ruggio, c., VI; Pedarreto, p.c., VI.
Rhagonycha banatica Rosh.: WITTMER, 1935: 74 (citazione e dato non ripreso da MOSCARDINI, 1968, l.c.);
Rhagonycha femoralis Brullé: Canale di Malevento, r., VII; Vacquarro, 1 ex.,

VI; Timpa del Demonio, c., VI; Valle Malvento, 1 ex., VI; Piano Ruggio, c., VI;

Rhagonycha fulva Scop.: MOSCARDINI, 1958: 85; Anticristo, c., VII; Campotenese, r., VII;

Rhagonycha lignosa Müll.: WITTMER, 1935: 74; MOSCARDINI, 1968: 87; Vacquarro, r., VI; Valle Zaperna, c., VI; Valle Malvento, r., VI; Anticristo, c., VI-VII;

Rhagonycha lutea Müll.: MOSCARDINI, 1968: 86;

Rhagonycha nigrosuta Fiori: MOSCARDINI, 1968: 83; Lago Fondo, r., VI; Timpa del Demonio, 1 ex., VII; Vallone Zaperna, c., VI; Valle Malvento, p.c., VI-VII.

Malthinus balteatus Suffr.: WITTMER, 1935: 74; Anticristo, 1 ex., VI;

Malthinus devillei Ab.: WITTMER, 1935: 74; (M);

Malthinus flaveolus Payk.: WITTMER, 1935: 74;

Malthinus insignipes Pic: WITTMER, 1935: 74; (M);

Malthinus striatulus Marsh.: WITTMER, 1935: 74; (M).

Malthodes facetus Kiesw.: WITTMER, 1935: 74;

Malthodes hexacanthus Kiesw.: WITTMER, 1935: 74; (M);

Malthodes parthenias Kiesw.: WITTMER, 1935: 74;

Malthodes solarii Pic: WITTMER, 1935: 74;

Malthodes sparthifer Kiesw.: WITTMER, 1935: 74; (M).

DRYLIDAE

Drylus flavescens Ol.: Cozzo di Visitone, r., VI; Valle Malvento, 1 ex., VI; Cozzo Dimoniello, 1 ex., VI; Pedarreto, p.c., VI-VIII.

MELYRIDAE

Anthocomus coccineus Schall.: Duglia, 1 ex., VI.

Attalus amictus Er.: PARDO-ALCAIDE, 1961: 5;

Attalus analis Panz.: WITTMER, 1935: 74; Piano Ruggio, r., VII;

Attalus nourricheli Cast.: WITTMER, 1935: 74; Duglia, c., VIII.

Axinotarsus italicus Escal.: PARDO-ALCAIDE, 1961: 5;

Axinotarsus ruficollis Ol.: WITTMER, 1935: 74; Valle Malvento, r., VII; Anticristo, p.c., VII.

Charopus docilis Kiesw.: WITTMER, 1935: 74;

Charopus pallipes Ol.*: Anticristo, p.c., VI.

Colotes maculatus Cast.: Piano Ruggio, 1 ex., VI; Anticristo, r., VII.

Cyrtosus ovalis Cast.: WITTMER, 1935: 74; PARDO-ALCAIDE, 1961: 7.

Ebaeus ater Kiesw.: WITTMER, 1935: 74; (M).
Hypebaeus flavipes F.: WITTMER, 1935: 74; (M).
Malachius aeneus L.: Terranova P., 1 ex., VI;
Malachius arnaizi Pardo-Alc.: FOCARILE, 1975: 30; (M);
Malachius australis Rey: PARDO-ALCAIDE, 1961: 6;
Malachius bipustulatus L.: PARDO-ALCAIDE, 1961: 5;
Malachius calabrus Ab.: Valle Malvento, r., VI;
Malachius falcifer Ab.: PARDO-ALCAIDE, 1961: 6;
Malachius italicus Pardo-Alc.: PARDO-ALCAIDE, 1967: 97-104;
Malachius lusitanicus ab. *australis* Rey: WITTMER, 1935: 74; Cozzo di Visitone, r., VI;
Malachius parilis Er.: WITTMER, 1935: 74; PARDO-ALCAIDE, 1961: 7; Piano Ruggio, p.c., VII; Anticristo, 1 ex., VI;
Malachius spinipennis Germ.: PARDO-ALCAIDE, 1961: 6; Campotenese, c., VII;
Malachius viridis F.: PARDO-ALCAIDE, 1961: 6; Duglia, r., VI.
Sphinginus lobatus Ol.*: Duglia, 1 ex., VI, *leg.* e *coll.* MONTEMURRO.
Danacaea ambigua Muls.: Terranova P., *leg.* SCHATZMAYR & KOCH, *coll.* Museo di Milano (LIBERTI i.l.);
Danacaea aurichalcea Küst.: LIBERTI, 1978: 39; Vacquarro, 1 ex., VI; Vallone Zaperna, 1 ex., VI; Valle Malvento, r., VI; Piano Ruggio, 1 ex., VI; Anticristo, 1 ex., VI;
Danacaea concii Lib.: Terranova P., *leg.* SCHATZMAYR & KOCH, *coll.* Museo di Milano (LIBERTI i.l.);
Danacaea cusanensis Costa: WITTMER, 1935: 75; molto comune ovunque, V-VI;
Danacaea denticollis Baudi: WITTMER, 1935: 75;
Danacaea nigritarsis ssp. *brunneipes* Pic: WITTMER, 1935: 75 (sub *D. nigritarsis* Küst.); Piano Ruggio, 1 ex., VI; Anticristo, 1 ex., VI.
Dasytes aeneiventris Küst.: Duglia, r., VI; Vacquarro, 1 ex., VI; Timpa del Demonio, 1 ex., VI;
Dasytes aerosus Kiesw.: WITTMER, 1935: 75; Piano Ruggio, 1 ex., VII;
Dasytes coeruleus Deg.: GOBBI, 1973: 37; (M);
Dasytes flavipes Ol.: WITTMER, 1935: 75; Vallone Zaperna, 1 ex., VI; Valle Malvento, r., VI;
Dasytes lucanus Wittm.: WITTMER, 1935: 75;
Dasytes plumbeus Müll.: Duglia, r., VI; Vacquarro, p.c., VI; Piano Ruggio, r., VII; Anticristo, p.c., VI-VII; Campotenese, *leg.* e *coll.* LIBERTI (LIBERTI i.l.);
Dasytes sp. (gr. *apenninus*): Campotenese e Colle dell'Impiso, *leg.* e *coll.* LIBERTI (LIBERTI i.l.);

Dasytes (*Hapalogluta*) sp.: Valle Malvento, 1 ex., VI; Piano Ruggio, 1 ex., VI.
Divales bipustulatus F.: WITTMER, 1935: 75; Duglia, 1 ex., VIII; Piano Ruggio, c., VI;
Divales communimacula ab. *ater* Schils.: WITTMER, 1935: 75.
Haplocnemus nigricornis F.: WITTMER, 1935: 74;
Haplocnemus sp.: dint. Rotonda, 900 m, *leg.* e *coll.* LIBERTI (LIBERTI i.l.).
Henicopus falculifer Fairm.: WITTMER, 1935: 74; Vacquarro, 1 ex., VI; Piano Ruggio, c., VI; Anticristo, r., VI;
Henicopus pilosus Scop.: BAUDI, PICCIOLI & CAVANNA, 1882: 72.
Psilothrix aureolus Kiesw.: WITTMER, 1935: 75; Piano Ruggio, 1 ex., VII; Anticristo, c., VI-VII;
Psilothrix cyaneus Ol.: WITTMER, 1935: 75; Valle Malvento, 1 ex., VI; Piano Ruggio, c., VI;
Psilothrix viridicoeruleus Geoffr. (= *cyaneus* Ol.): Duglia, r., VI; Valle Malvento, 1 ex., VI; Piano Ruggio, r., VI; Anticristo, 1 ex., VI.

CLERIDAE

Clerus mutillarius F.: Duglia, 1 ex., VI; Pantano Grande, r., VI.
Necrobia rufipes Deg.: Campotenese, r., VII.
Opilio mollis L.: Campotenese, 1 ex., VII;
Opilio taeniatus var. *torretassoi* Wittm.: WITTMER, 1935: 76; Campotenese, p.c., VII; (E);
Thanasimus formicarius L.: WITTMER, 1935: 76; GOBBI, 1983: 58; Cugno Ruggeri, r., VI.
Tillus transversalis Charp.: Terranova P., r., VI;
Tillus elongatus L.: WITTMER, 1935: 75.
Trichodes alvearius F.: WITTMER, 1935: 76; Cugno dell'Acero, 1 ex., VII; Piano Ruggio, c., VI-VII; Campotenese, c., VII;
Trichodes apiarius L.: WITTMER, 1935: 76; Duglia, 1 ex., VI;
Trichodes leucopsideus Ol.: WITTMER, 1935: 76; GOBBI, 1973: 37; Pantano Grande, 1 ex., VI.

LYMEXYLONIDAE

Hylecoetus dermestoides L.*: Coppola di Paola, rif. Rotonda, 1 ex., VI.

CEBRIONIDAE

Cebrio dubius Rossi *: Piano Ruggio, 1 ex., VIII;
Cebrio nigricornis Leoni *: Piano Ruggio, c., VII; (M).

ELATERIDAE

Adrastus rachifer ab. *humeropictus* Buyss.: BINAGHI, 1955: 17; Piano Ruggio, 1 ex., V; Campotenese, c., VII.
Agriotes acuminatus Steph.: Duglia, r., VI, *leg.* MONTEMURRO;
Agriotes brevis Cand.*: Valle Malvento, 1 ex.,VI; (M);
Agriotes grandini Cand.: BINAGHI, 1955: 15;
Agriotes infuscatus Desbr. et ab. *elegans* Schw.: BINAGHI, 1955: 16; Vacquarro, c., VI; Timpa del Demonio, c., VI; Piano Ruggio, c., VI; Anticristo, 1 ex., VI;
Agriotes lineatus F.: Campotenese, 1 ex., VII;
Agriotes litigiosus ab. *laichartingi* Gredl.: BINAGHI, 1955: 16; Valle Malvento, 1 ex., VI.
Agrypnus murinus L.: BINAGHI, 1955: 1 (sub *Adelocera murina* L.); Piano Pollino, r., VI; Piano Toscano, p.c., VI; Timpa del Demonio, r., VI; Piano Ruggio, c., VI.
Ampedus cinnabarinus Eschh.*: Piano Ruggio, r., VI;
Ampedus elegantulus Schönh.: BINAGHI, 1955: 3; GOBBI, 1973: 35;
Ampedus melanurus Muls.**: Duglia, 1 ex., IX; noto di A. Marittime e Piemonte (LUIGIONI, 1929: 551); (M);
Ampedus pomorum Herbst: BINAGHI, 1955: 2; Vacquarro, 1 ex., VI; Timpa del Demonio, r., VI; Piano Ruggio, 1 ex., VI;
Ampedus rufipennis Steph.: BINAGHI, 1955: 2; Piano Ruggio, 1 ex., VII;
Ampedus sanguineus L.*: Coppola di Paola, rif. Rotonda, p.c., VI;
Ampedus sinuatus Germ.: Timpa del Demonio, 1 ex., VI; Cozzo di Visitone, r., VI.
Anostirus purpureus Poda: BINAGHI, 1955: 13; Coppola di Paola, pendici sud, 1 ex., VII; (M).
Athous haemorrhoidalis F.: BINAGHI, 1955: 11; Timpa del Demonio, 1 ex., VI; Piano Ruggio, 1 ex., VI;
Athous ineptus Cand.: BINAGHI, 1955: 12; Valle Malvento, 1 ex., VI;
Athous niger L.: Vacquarro, 1 ex., VII;
Athous puncticollis Kiesw.: Vacquarro, r., VI;

Athous subfuscus Müll.: BINAGHI, 1955: 13; Vacquarro, 1 ex., VI; Valle Zaperna, c., VI; Valle Malvento, c., VI; Piano Ruggio, c., VI;
Athous villosus Fourcr.: BINAGHI, 1955: 11; GOBBI, 1973: 35;
Athous vittatus F. et ab. *impallens* Buyss.: BINAGHI, 1955: 12; Vallone Zaperna, c., VI; Valle Malvento, c., VI; Piano Ruggio, c., VI.
Cardiophorus collaris Er.: BINAGHI, 1955: 4; Timpa del Demonio, c., VI; Anticristo, p.c., VI;
Cardiophorus ebeninus Germ.: BINAGHI, 1955: 7;
Cardiophorus incanus Er.: BINAGHI, 1955: 7;
Cardiophorus melampus Stierl.: BINAGHI, 1955: 5;
Cardiophorus rufipes Er.: BINAGHI, 1955: 7; Timpa del Demonio, 1 ex., VI;
Cardiophorus ulcerosus Gené ab.: BINAGHI, 1955: 4; Pantano Grande, 1 ex., VI;
Cardiophorus vestigialis Er.: Terranova P., 1 ex., VI.
Cidnopus minutus L.: Valloncello di Viggianello, 1 ex., VII; Piano Ruggio, r., VI;
Cidnopus parvulus Panz.: BINAGHI, 1955: 9; Piano Toscano, r., VI;
Cidnopus pseudopilosus Platia: BINAGHI, 1955: 9 (sub *C. pilosus* Leske); Timpa del Demonio, c., V; Vallone Zaperna, r., VI; Valle Malvento, 1 ex., VI; Piano Ruggio, r., VI; Anticristo, p.c., VI-VII.
Compsolacon crenicollis Mén.: Piano Pollino, p.c., VI; Piano Ruggio, 1 ex., VI; Anticristo, 1 ex., VI.
Ctenicera pectinicornis L.: BINAGHI, 1955: 13; Coppola di Paola, pendici sud, p.c., VII; (M).
Denticollis rubens Piller: BINAGHI, 1955: 17; GOBBI, 1973: 35; Fosso Mauro, r., VI; Coppola di Paola, pendici sud, c., VII; (M).
Dicronychus cinereus Herbst: Duglia, r., VII; Campotenese, 1 ex., VI;
Dicronychus equiseti Herbst: Vallone della Caballa, 1 ex., VI.
Dolopius marginatus L.: BINAGHI, 1955: 16.
Drasterius bimcaulatus ab. *variegatus* Küst.: BINAGHI, 1955: 2; Anticristo, r., VI-VII.
Harminius castaneus Fairm.: BINAGHI, 1955: 10.
Hemicrepidius hirtus Herbst: BINAGHI, 1955: 11 (sub *Athous hirtus* Herbst); Piano Pollino, c., VI-VII; Piano Toscano, r., VI; Piano Ruggio, p.c., VI-VII.
Hypolithus dermestoides ab. *submaculatus* Reitt.: BINAGHI, 1955: 4
Idolus anatolicus Cand.*: Piano Ruggio, 1 ex., VI;
Idolus picipennis Bach: BINAGHI, 1955: 3; Vacquarro, 1 ex., VI; Valle Malvento, r., VI; Piano Ruggio, p.c., VI-VII; Anticristo, r., VI.
Lacon punctatus Herbst: BINAGHI, 1955: 1.

Limonius quercus ab. *candezei* Buyss.: BINAGHI, 1955: 9; Piano Ruggio, 1 ex., VI; Anticristo, r., VI.

Melanotus castaneipes Payk.: BAUDI, PICCIOLI & CAVANNA, 1882: 71; BINAGHI, 1955: 8; Vacquarro, 1 ex., VI; Piano Ruggio, r., VI; Coppola di Paola, r., VI; Anticristo, 1 ex., VI;

Melanotus crassicollis Er.: BINAGHI, 1955: 8; Piano Ruggio, 1 ex., VII, *leg.* MONTEMURRO;

Melanotus rufipes var. *punctaticollis* Bris.: BINAGHI, 1955: 8; Vacquarro, r., VI;

Melanotus tenebrosus Er.: BINAGHI, 1955: 9; Piano Ruggio, 1 ex., VI; Anticristo, p.c., VII.

Prosternon tesselatum L.: BINAGHI, 1955: 15; Canale di Malevento, p.c., VII; Piano Pollino, c., VI; Piano Toscano, c., VI.

Quasimus minutissimus Germ.: BINAGHI, 1955: 4; Duglia, 1 ex., VI; Campotenese, r., VI.

Selatosomus amplicollis ssp. ? *montenegrinus* Reitt.: BINAGHI, 1955: 14; Piano Pollino, r., VI; Piano Toscano, r., VI; Piano Ruggio, 1 ex., VI;

Selatosomus impressus F.**: Piano Toscano, r., VI; Vacquarro, 1 ex., VI; Colle dell'Impiso, 1 ex., VI; noto di Alpi, Veneto e Trentino A. Adige (LUIGIONI, 1929: 567); (M);

Selatosomus latus var. *pasticus* Mén.: BINAGHI, 1955: 14; Vacquarro, r., VII; Serra del Prete, pendici ovest, 1 ex., VI; Piano Ruggio, r., VI; Anticristo. 1 ex., VI; Campotenese, 1 ex., VII;

Selatosomus melancholicus F.: BINAGHI, 1955: 15; (M).

Synaptus filiformis F.: Campotenese, r., VI.

EUCNEMIDAE

Farsus dubius Pill.: Terranova P., p.c., VI-VII.

Isorhipis melasoides Lap.: GOBBI, 1973: 36; (M).

Melasis buprestoides L.: BINAGHI, 1955: 17; GOBBI, 1973: 36; Coppola di Paola, rif. Rotonda, r., VI.

Xylobius corticalis Payk.: GOBBI, 1973: 36.

THROSCIDAE

Drapetes biguttatus Pill. *et* ab. *mordelloides* Host.: BINAGHI, 1955: 17;

Drapetes cinctus Panz.: Campotenese, 1 ex., X.

BUPRESTIDAE

Acmaeodera bipunctata Ol.: Gobbi, 1971: 41; Coppola di Paola, rif. Rotonda, 1 ex., VI;

Acmaeodera pilosellae Bon.: Gerini, 1955: 1; Gobbi, 1971: 41; Colle del Dragone, 1 ex., VII;

Acmaeodera quadrifasciata Rossi *: Terranova P., r., VII; Campotenese, r., VI; (M);

Acmaeodera tassii Schaef.: Sama, 1979: 16; Gobbi, 1981: 33; Cozzo di Dimoniello, 2 exx., VI.

Acmaeoderella flavofasciata Pill.: Gerini, 1955: 1; Gobbi, 1971: 42 (sub *Acmaeodera flavofasciata* Pill.); Vacquarro, r., VI; Colle del Dragone, c., VII.

Agrilus angustulus Ill.: Gerini, 1955: 5; Anticristo, 1 ex., VI;

Agrilus aurichalceus Redtb.: Gerini, 1955: 6; Gobbi, 1971: 4;

Agrilus calcicola Obenb.: Gobbi, 1971: 54; Campotenese, r., VII;

Agrilus convexicollis ssp. *mancinii* Obenb.: Gerini, 1955: 5; (M);

Agrilus graminis Cast. & Gory: Gobbi, 1971: 53;

Agrilus hastulifer Ratzb.**: Piano Ruggio, 1 ex., VII; noto di Lombardia, Friuli V. Giulia, Toscana, Lazio e Sardegna (Luigioni, 1929: 592); Piemonte e Sicilia (Curletti i.l.);

Agrilus hyperici Creutz.: Gerini, 1955: 6; Gobbi, 1971: 57;

Agrilus integerrimus Ratzb.: Gobbi, 1971: 55;

Agrilus viridicaerulans ssp. *rubi* Schaef.: Gerini, 1955: 6; Duglia, 1 ex., VI;

Agrilus viridis L.: Gerini, 1955: 5; Gobbi, 1971: 54; Coppola di Paola, rif. Rotonda, 1 ex., VI; Anticristo, r., VII.

Anthaxia cichorii Ol.: Gerini, 1955: 3; Campotenese, r., VI;

Anthaxia cyanescens Gory: Gobbi, 1981: 36;

Anthaxia domina ssp. *aprutiana* Ger.: Gerini, 1955: 3;

Anthaxia fulgurans Schrnk.: Gobbi, 1971: 48; (M);

Anthaxia funerula Ill.: Gerini, 1955: 4;

Anthaxia godeti Cast.: Gerini, 1952: 90; 1955: 4; Gobbi, 1971: 50; Valle Malvento, 1 ex., VI; Coppola di Paola, pendici nord-est, 1 ex., VI; Anticristo, 1 ex., VI;

Anthaxia helvetica ssp. *apennina* Obenb.: Gobbi, 1971: 49; Duglia, r., VI;

Anthaxia hungarica Scop.: Gerini, 1955: 2; Piano Ruggio, c., VI-VII;

Anthaxia hypomelaena Ill.: Gerini, 1955: 4; Terranova P., 1 ex., VI;

Anthaxia kochi Obenb.: Porta, 1949: 245; Tassi, 1966 a: 20; Gobbi, 1971: 49;

Anthaxia millefolii ssp. *polichloros* Ab.: GERINI, 1955: 2; Duglia, c., VI-VII; Piano Pollino, p.c., VI; Cozzo di Dimoniello, r., VI; Colle del Dragone, r., VI;
Anthaxia nitidula L.: GOBBI, 1971: 49; Pantano Grande, r., VI;
Anthaxia scutellaris Gené: Pantano Grande, 1 ex., VI;
Anthaxia semicuprea Küst.: GERINI, 1955: 3; GOBBI, 1971: 48;
Anthaxia thalassophila Ab.: GERINI, 1955: 3; GOBBI, 1971: 48.
Aphanisticus elogantus Villa: GERINI, 1955: 7.
Buprestis haemorrhoidalis Herbst: GOBBI, 1971: 44;
Buprestis novemmaculata L.: GOBBI, 1971: 45;
Buprestis octoguttata L.: GOBBI, 1971: 45; (M);
Buprestis splendens F.: GOBBI, 1971: 45; (M).
Chrysobothris affinis F.: GOBBI, 1971: 51; Duglia, 1 ex., V; Timpa del Demonio, c., VI; Piano Ruggio, p.c., VII; Coppola di Paola, r., VI; Anticristo, c., VI-VIII;
Chrysobothris chrysostigma L.: GOBBI, 1971: 50.
Coroebus elatus F.: GERINI, 1955: 5; GOBBI, 1971: 51; Pantano Grande, r., VI; Valle Malvento, 1 ex., VI;
Coroebus rubi L.: GERINI, 1955: 4; GOBBI, 1971: 51; Duglia, c., VI-VIII; Acqua Tremola, r., VI; Valle di Malvento, r., VI; Madonna di Pollino, p.c., VII; Pedarreto, r., VI; Anticristo, 1 ex., VI.
Dicerca alni Fisch.: GERINI, 1955: 2; GOBBI, 1971: 43; Terranova P., 1 ex., VI; Colle Gaudolino, 1 ex., VII; Campotenese, r., VI.
Eurythyrea austriaca L.: PORTA, 1949: 360; TASSI, 1966 a: 20; GOBBI, 1971: 44; Terranova P., 1 ex., VI.
Meliboeus violaceus Kiesw.: GERINI, 1955: 5; Duglia, 1 ex., VII.
Phaenops knoteki ssp. *ochsi* Schaef.: GOBBI, 1971: 47.
Ptosima undecimmaculata Herbst: GERINI, 1955: 1.
Sphenoptera antiqua ab. *aridiventris* Cast.: GERINI, 1955: 2;
Sphenoptera laportei Saund.: GERINI, 1955: 2; Piano Ruggio, 1 ex., VII.
Trachys minutus L.: Duglia, r., VI; Pantano Grande, 1 ex., VI;
Trachys scrobiculatus Kiesw.: GERINI, 1955: 7; Coppola di Paola, pendici sud, 1 ex., VII.

DASCILLIDAE

Dascillus cervinus L.: BINAGHI, 1955: 18; Piano Ruggio, p.c., VI-VII; Coppola di Paola, pendici sud, p.c., VII.

HELODIDAE

Cyphon palmi Nyholm: PORTA, 1949: 359; (E);
Cyphon palustris Thoms.: FOCARILE, 1960 b: 119;
Cyphon unguiculatus Nyholm: FOCARILE, 1961: 267.
Microcara pilosula Reitt.: FOCARILE, 1960 b: 115.

EUCINETIDAE

Eucinetus meridionalis Cast.: Coppola di Paola, pendici nord-est, r., VIII.

DRYOPIDAE

Dryops luridus Er.: Duglia, r., VI;
Dryops sulcipennis Costa: Duglia, 1 ex., VII; L. Fondo, 1 ex., VI.

ELMIDIDAE

Limnius perrisi Duf.*: Duglia, r., VII;
Limnius opacus Müll.*: Duglia, r., VI-VII.
Riolus subviolaceus Müll.*: Vacquarro, r., VI.

HETEROCERIDAE

Heterocerus fenestratus Thunb.: Campotenese, r., VII;
Heterocerus flavidus Rossi: Campotenese, c., VII.

DERMESTIDAE

Anthrenus fuscus Ol.: Terranova P., 1 ex., VIII;
Anthrenus munroi Hint.*: Campotenese, 1 ex., 10.VII.1985; ANGELINI & MONTEMURRO (1986: in stampa) lo segnalano di Policoro (Basilicata) come nuovo per la fauna italiana;
Anthrenus pimpinellae ssp. *mroczkowskii* Kal.*: Terranova P., ex., VII/1977; ANGELINI & MONTEMURRO (1986: in stampa) lo segnalano di Policoro (Basilicata) come nuovo per la fauna italiana; (M);

Anthrenus signatus Er.**: Terranova P., 1 ex., V; noto di Friuli V. Giulia, Sicilia e Sardegna (LUIGIONI, 1929: 541);
Anthrenus verbasci L.: Terranova P., r., VI.
Attagenus calabricus Reitt.: Terranova P., r., VI;
Attagenus pellio v. *pilosissimus* Roub.: Campotenese, 1 ex., VIII;
Attagenus punctatus Scop.: Terranova P., 1 ex., V;
Attagenus unicolor Br.*: Pedarreto, a., VII.
Ctesias serra F.*: Campotenese, r., VI-VII.
Dermestes frischi Kug.: Duglia, r. VI;
Dermestes laniarius Ill.*: Campotenese, 1 ex., VII;
Dermestes olivieri Lep.: Cugno dell'Acero, r., VIII; Fontana Rummo 1 ex., VII; Valle Malvento, p.c., VIII.
Globicornis marginata Payk.**: Duglia, c., VI; nota di Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino A. Adige, Toscana (LUIGIONI, 1929: 539); (M);
Globicornis picta Küst.*: Anticristo, p.c., VI;
Globicornis ? *sulcata* Bris.: Campotenese, r., VI-VII;
Globicornis variegata Küst.: Anticristo, p.c., VI.
Orphilus niger Rossi: Terranova P., r., VI; Campotenese, p.c., V-VII.

BYRRHIDAE

Byrrhus numidicus Norm. (= *grandii* Fiori): PORTA, 1949: 174; Piano Pollino, 1 ex., VI;
Byrrhus pustulatus Först.: PORTA, 1959: 174.

TROGOSITIDAE

Nemosoma elongatum L.: Piano Ruggio, 1 ex., VII, *leg.* MONTEMURRO.
Ostoma ferruginea L.*: Cugno Ruggeri, r., VI-VII.
Temnochila coerulea Ol.: GOBBI, 1983: 51.
Tenebroides mauritanicus L.: Duglia, r., VII; Piano Ruggio, r., VII, *leg.* MONTEMURRO.
Thymalus limbatus F.: BAUDI, PICCIOLI & CAVANNA, 1882: 69; Cugno Ruggeri, p.c., VI-VII.
Zimioma grossum L.: GOBBI, 1973: 36.

BYTURIDAE

Byturus tomentosus F.: Gobbi, 1973: 37.
Diplocoelus fagi Guér.: Duglia, r., VIII.

NITIDULIDAE

Brachypterolus linariae Corn.*: Piano Ruggio, 1 ex., VI; (M);
Brachypterolus urticae F.: Marek, 1961: 1; Duglia, r., VI.
Cryptarca strigata F.*: Terranova P., r., VIII;
Cryptarca undata Ol.*: Terranova P., 1 ex., VIII.
Epuraea aestiva L.: Timpa del Demonio, 1 ex., VI; Terranova P., r., V;
Epuraea fuscicollis Steph.: Marek, 1961: 2;
Epuraea guttata Ol.: Audisio, 1976: 96; Terranova P., 1 ex., VI; (M);
Epuraea longula Er.*: Piano Ruggio, 1 ex., VI, *leg.* Montemurro;
Epuraea melina Er.*: Piano Ruggio, c., VI;
Epuraea obsoleta F.: Marek, 1961: 2;
Epuraea pallescens Steph.*: Campotenese, r., VII;
Epuraea silacea Herbst: Marek, 1961: 2; Piano Ruggio, 1 ex., VII, *leg.* Montemurro; (M);
Epuraea unicolor Ol.: Piano Ruggio, 1 ex., VII, *leg.* Montemurro.
Ipidia quadrimaculata Quens.: Marek, 1961: 2.
Meligetes aeneus F.: Piano Ruggio, c., VI;
Meligetes angustatus Küst.*: Piano Ruggio, r., VI, *leg.* Montemurro; (M);
Meligetes anthracinus Bris.*: Piano Ruggio, 1 ex., VII; (M);
Meligetes atratus Ol.: Terranova P., p.c., V;
Meligetes brevis Sturm *: Campotenese, p.c., VIII;
Meligetes erichsoni Bris.*: Piano Ruggio, 1 ex.,VI;
Meligetes erythropus Marsh.: Piano Ruggio, c., VI; Coppola di Paola, pendici sud, 1 ex., VI;
Meligetes flavimanus Steph.: Terranova P., 1 ex., VII;
Meligentes fumatus Er.*: Terranova P., 1 ex., VI; (M);
Meligetes lepidii Mill.*: Terranova P., r., VI; Campotenese, r., VI;
Meligetes nigrescens Steph.: Duglia, 1 ex., V; Anticristo, p.c., VI;
Meligetes paschalis Sporn.*: Piano Ruggio, 1 ex., VI, *leg.* Montemurro;
Meligetes planiusculus Heer: Cugno dell'Acero, p.c., IV;
Meligetes punctatus Bris.: Duglia, p.c., VI; Piano Ruggio, c., VI;
Meligetes reyi Guill.: Audisio, 1975: 2; (M);

Meligetes sordidus Kug.: AUDISIO, 1975: 2; (M);
Meligetes subrugosus Gyll.: Campotenese, 1 ex., VII;
Meligetes umbrosus Sturm: Duglia, r., V; Piano Ruggio, c., VI;
Meligetes viridiscens F.: Acqua Tremola, p.c., VI; pendici nord-ovest di Serra Dolcedorme, 1 ex., VI; Vacquarro, r., VI; Vallone Zaperna, 1 ex., VI; Piano Ruggio, c., VI; Anticristo, p.c., VI.
Nitidula carnaria Schall.: Piano Ruggio, p.c., VI.
Pocadius ferrugineus F. ab. *thoracicus* Reitt.: MAREK, 1961: 3; Piano Toscano, r., VI; Colle dell'Impiso, 1 ex., VII; Piano Ruggio, r., VI-VIII.
Soronia oblonga Bris.: MAREK, 1961: 2.

RHIZOPHAGIDAE

Rhizophagus bipustulatus F.: MAREK, 1961: 3; Duglia, c., V-VII; Coppola di Paola, rif. Rotonda, c., VI-VIII;
Rhizophagus dispar Payk.: BAUDI, PICCIOLI & CAVANNA, 1882: 69; Coppola di Paola, rif. Rotonda, c., VI;
Rhizophagus nitidulus F.: MAREK, 1961: 3.

CUCUJIDAE

Ahasversus advena Waltl.: Campotenese, c., VI.
Cryptolestes ferrugineus Steph.: Duglia, p.c., V-VII; Acqua Tremola, 1 ex., VI; Colle Gaudolino, r., VII;
Cryptolestes spartii Curt.: Colle del Dragone, p.c., VII; Anticristo, c., VI.
Laemophloeus monilis F.: Piano Ruggio, p.c., V-VII; Coppola di Paola, pendici sud, 1 ex., VI.
Monotoma longicollis Gyll.: Terranova P., r., VI.
Oryzaephilus surinamensis L.: Campotenese, r., VI.
Pediacus dermestoides F.*: Piano Ruggio, r., VI.
Placonotus testaceus F.: Campotenese, c., VI-VIII.
Psammoecus bipunctatus F.*: Campotenese, 1 ex., VI; (M).
Silvanus unidentatus F.: Terranova P., c., V-VIII.
Uleiota planata L.: Piano delle Mandre, r., VI; Coppola di Paola, pendici sud, 1 ex., VII.

EROTYLIDAE

Dacne pontica Bed.: ZAMPETTI, 1979: 96; Piano Ruggio, c., VII;
Dacne rufifrons F.*: Duglia, c., VII; Vacquarro, 1 ex., VI; Piano Ruggio, c., V-IX; Anticristo, p.c., VI; (M).
Triplax aenea Schall.: Duglia, 1 ex., VIII, *leg.* MONTEMURRO;
Triplax lacordairei Crot.: GOBBI, 1973: 37; Duglia, r., VIII; Vallone di Viggianello, r., VII; Valle Malvento, 1 ex., VI; Pedarreto, p.c., VI-VII;
Triplax marseuli Bed.: Cugno dell'Acero, c., VI-IX; (M);
Triplax russica L.: Duglia, p.c., VII-IX.
Tritoma bipustulata F.: Terranova P., r., VI.

CRYPTOPHAGIDAE

Antherophagus nigricornis F.: OTERO & ANGELINI, 1984: 90; Valle Malvento, 1 ex., VI, *leg.* MONTEMURRO; (M).
Atomaria pusilla Payk.: OTERO & ANGELINI, 1984: 91; Rotonda, 1 ex., IX;
Atomaria ruficornis Marsh.: OTERO & ANGELINI, 1984: 93; Duglia, 1 ex., VII, *leg.* DE MARZO; Rotonda, c., IX;
Atomaria slavonica Johns.: OTERO & ANGELINI, 1984: 91; Duglia, 1 ex., VIII, *leg.* DE MARZO; (M).
Cryptophagus badius Sturm: OTERO & ANGELINI, 1984: 83; Duglia, c., VII, *leg.* DE MARZO;
Cryptophagus dentatus Herbst: OTERO & ANGELINI, 1981: 97; 1984: 86; Duglia, r., IX; *leg.* ANGELINI & MONTEMURRO; Piano Ruggio, 1 ex., VII;
Cryptophagus pilosus Gyll.: OTERO & ANGELINI, 1984: 89; Coppola di Paola, pendici nord-est, 1 ex., VII;
Cryptophagus scanicus L.: OTERO & ANGELINI, 1981: 99; 1984: 87; Duglia, 1 ex., VIII, *leg.* DE MARZO; Piano Ruggio, p.c., VI-VIII, *leg.* ANGELINI & MONTEMURRO.
Sternodea baudii Reitt.: OTERO & ANGELINI, 1984: 91; Valle Malvento, 1 ex., VIII.

PHALACRIDAE

Olibrus bisignatus Mén.: PORTA, 1959: 165.
Tolyphus punctatostriatus Kraatz: Terranova P., p.c., VI.

MEROPHYSIIDAE

Holoparamecus caularum Aubé *: Campotenese, r., VI-VII.

LATHRIDIIDAE

Aridius nodifer Westw.: Piano Ruggio, 1 ex., VI; Colle del Dragone, r., VII.
Corticaria fulva Com.: Acqua Tremola, 1 ex., VI;
Corticaria obscura Bris.*: Anticristo, r., VII;
Corticaria serrata Payk.: Duglia, c., VIII, *leg.* De Marzo; Coppola di Paola, pendici nord-est, 1 ex., VII.
Cortinicara gibbosa Herbst: Piano Ruggio, 1 ex., VIII; Campotenese, r., VII.
Dienerella elongata Curt.: Duglia, c., VIII, *leg.* De Marzo; Piano Ruggio, r., X;
Dienerella parilis Rey *: Piano Ruggio, 1 ex., VI.
Enicmus brevicornis Mannh.: Serra del Prete, pendici nord-est, r., VI;
Enicmus histrio Joi & Tomlin: Piano Ruggio, 1 ex., VI; (M);
Enicmus rugosus Herbst: Cugno dell'Acero, r., VII; Piano Ruggio, 1 ex., VIII; Coppola di Paola, pendici nord-est, c., VII;
Enicmus transversus Ol.: Serra del Prete, pendici nord-est, r., VI-VII.
Latridius anthracinus Mannh.**: Piano Ruggio, 1 ex., VI, *leg.* e *coll.* Montemurro; noto di A. Marittime, Trentino A. Adige, Piemonte (Luigioni, 1929: 532); (M);
Latridius brevicollis Thoms.: Colle dell'Impiso, r., VII;
Latridius consimilis Mannh.*: Colle del Dragone, r., VI; (M);
Latridius minutus L.: Duglia, r., VIII, *leg.* De Marzo, *coll.* Angelini.
Melanophthalma fuscipennis Mannh.: Serra delle Ciavole, pendici sud-est, r., VII; Piano Ruggio, p.c., VII;
Melanophthalma taurica Mannh.: Vacquarro, p.c., VII; Piano Ruggio, c., VII; Campotenese, c., VII;

DASYCERIDAE

Dasycerus sulcatus Broung.*: Coppola di Paola, pendici sud, 1 ex., VII.

MYCETOPHAGIDAE

Litargus connexus Geoffr.: Pantano Grande, p.c., VI-VII.
Micetophagus quadripustulatus L.: Duglia, 1 ex., VIII, *leg.* De Marzo.

Mycetoporus atomarius F.: Duglia, c., VI; Valle Malvento, c., VIII; Piano Ruggio, p.c., VI-IX; Fosso Mauro, r., VI-VII; Coppola di Paola, pendici nord-est, c., VI; Campotenese, r., VII.

Tryphillus bicolor F.: Duglia, p.c., VI; Colle dell'Impiso, r., VII; Vacquarro, r., VI; Valle Malvento, c., VI; Piano Ruggio, c., VI.

Typhaea stercorea L.: Piano delle Mandre, c., VI; Cugno Ruggeri, r., VIII; Valloncello di Viggianello, c., VII.

COLYDIIDAE

Aglenus brunneus Gyll.: Campotenese, 1 ex., VI.

Bothrideres contractus F.: Gobbi, 1973: 38; Terranova P., r., VI-VII.

Cerophachis celtis Germ.: Duglia, c., VII; Coppola di Paola, pendici sud, r., VII.

Cicones variegatus Hellw.: Duglia, r., VIII; *leg.* De Marzo; Vacquarro, 1 ex., VI; Vallone Zaperna, r., VI; Valle Malvento, p.c., VIII; Piano Ruggio, p.c., VIII; Coppola di Paola, pendici nord-est, c., VII.

Colobicus hirtus Rossi: Cugno Ruggeri, 1 ex., VI; Coppola di Paola, pendici sud, r., VII.

Coxelus pictus Sturm: Gobbi, 1973: 38; Vacquarro, 1 ex., VI; Coppola di Paola, pendici nord-est, p.c., VI-VII.

Ditoma crenata F.: Duglia, p.c., V-IX; Piano delle Mandre, 1 ex., VI; Cozzo Dimoniello, Fosso Mauro, r., V.

Endophloeus markovickianus Pill.: Duglia, 1 ex., IX.

Oxylaemus cylindricus Panz.**: Duglia, 1 ex., V; noto di Emilia, Abruzzo, Sardegna (Luigioni, 1929: 491).

Pycnomerus tenebrans Ol.: Gobbi, 1973: 38.

Tarphius gibbulus Germ.*: Coppola di Paola, pendici nord-est, r., VII.

Teredrus cylindricus Ol.: Terranova P., r., VI-VIII.

CERYLONIDAE

Cerylon fagi Bris.: Duglia, c., V-IX; Colle dell'Impiso, 1 ex., VI; Timpa del Demonio, r., VI; Valle Malvento, c., VIII; Piano Ruggio, c., VI-VIII; Coppola di Paola, pendici nord-est, e sud, c., VI-VIII;

Cerylon ferrugineum Steph.: Duglia, c., V-VIII; Serra del Prete, pendici ovest, c., VI; Piano Ruggio, c., VI;

Cerylon histeroides F.: Duglia, p.c., VI; Vacquarro, r., VI; Coppola di Paola, rif. Rotonda, c., VI.

Philothermus evanescens Reitt.*: Duglia, c., VI-VIII;
Philothermus semistriatus Perr.: Acqua Tremola, 1 ex., VI; (M).

ENDOMYCHIDAE

Endomychus coccineus L.: Terranova P., c., V; Colle Gaudolino, r., VII.
Lycoperdina bovistae F.: Colle dell'Impiso, p.c., VIII; Valle Malvento, p.c., VI;
Lycoperdina validicornis Gerst.: Vacquarro, 1 ex., VII; noto di Toscana, Lazio e Sardegna (LUIGIONI, 1929: 502).
Mycetina cruciata Schall.: GOBBI, 1973: 38; Acqua Tremola, r., VI.
Mycetaea hirta Marsh.: Vacquarro, 1 ex., VII.

COCCINELLIDAE

Adalia bipunctata L.: Piano delle Mandre, c., VI; Valle Malvento, c., VIII; Campotenese, p.c., VI-VIII;
Adalia decempunctata L.: Duglia, c., VI-VIII; Vacquarro, 1 ex., VII; Piano Ruggio, 1 ex., VII; Campotenese, r., VII.
Anisosticta novemdecimpunctata L.: Cugno Ruggeri, 1 ex., VII.
Calvia quatuordecimguttata L.*: Terranova P., r., VI-VII; Piano Ruggio, 1 ex., VI.
Chilocorus bipustulatus L.: Terranova P., p.c., VI-VII; Campotenese, r., VI.
Coccinella septepunctata L.: BAUDI, PICCIOLI & CAVANNA, 1882: 81; molto comune ovunque, IV-VIII.
Coccinula quatuordecimpustulata L.: Duglia, r., VI.
Exochomus quadripustulatus L.: Colle dell'Impiso, 1 ex., VII.
Halyzia sedecimguttata L.: Campotenese, 1 ex., VI.
Harmonia quadripunctata Pont.*: Duglia, p.c., VI; Valle Malvento, 1 ex., VII; Anticristo, r., V-VII.
Hippodamia variegata Goeze: strada Terranova P.-Duglia, 1 ex., VI; Duglia, c., VI-VII; Campotenese, r., VI-VII.
Lindorus lophantae Blaisd.*: Terranova P., 1 ex., V; (M).
Myrrha octodecimguttata L.*: Duglia, c., VII; Valle Malvento, c., VIII; Piano Ruggio, r., VI-VII; Anticristo, c., VI.
Nephus bipunctatus Kug.: Piano Ruggio, 1 ex., VI;
Nephus nigricans Weise *: Terranova P., r., VI; Anticristo, r., VI.
Nephus quadrimaculatus Herbst: Duglia, r., VI.

Oenopia conglobata L.: Terranova P., 1 ex., VII;
Oenopia lyncea Ol.: Campotenese, p.c., VI.
Platinaspis luteorubra Goeze: Canale di Malevento, r., VII; Piano Pollino, r., VII.
Propylaea quatuordecimpunctata v. *leopardina* Weise *: Madonna di Pollino, r., VII; Piano Ruggio, p.c., VII.
Psyllobora vigintiduopunctata L.: Cugno dell'Acero, r., VI; Serra delle Ciavole, pendici sud-est, 1 ex., VII; Piano Pollino, r., VII; Colle Gaudolino, r., VI; Valle Malvento, c., VI; Colle del Dragone, c., VI-VII.
Rhizobius litura F.: Colle Gaudolino, r., VII; Valle Malvento, c., VIII.
Scymnus (Pullus) auritus Thunbg.: SCHATZMAYR, 1943: 135 (sub *Pullus auritus* Thunbg.); Vacquarro, 1 ex., VI;
Scymnus (Pullus) mediterraneus Khnz.: Duglia, r., VI-VII; Valle Malvento, 1 ex., VI;
Scymnus (Pullus) subvillosus Goeze: Terranova P., r., VI-VII; Cozzo di Visitone, r., VI; Anticristo, r., VII;
Scymnus (Pullus) suturalis Thunbg.: Valle Malvento, 1 ex., VIII;
Scymnus apetzi Muls.: Pantano Grande, r., VI; Valle Malvento, r., VI; Coppola di Paola, pendici sud e vetta, r., VII;
Scymnus frontalis immaculatus Suffr.: Duglia, 1 ex., VII;
Scymnus marginalis Rossi *: Vallone Zaperna, r., VI; Anticristo, r., VI; (M);
Scymnus rubromaculatus Goeze: Piano Pollino, r., VII; Valle Malvento, r., VI.
Sospita vigintiguttata L.*: Piano Ruggio, r., VI.
Stethorus punctillum Weise: Duglia, 1 ex., VI.
Subcoccinella vigintiquatuorpunctata L.: Colle dell'Impiso, p.c., VI-VII; Vacquarro, r., VI; Vallone e Piano Zaperna, r., VI-VII; Valle Malvento, p.c., VI; Piano Ruggio, c., VI-VII; Anticristo, 1 ex., VII.
Vibidia duodecimguttata Poda: Fontana Rummo, 1 ex., VI; Vacquarro, p.c., VI-VII; Piano Ruggio, 1 ex., VII.

SPHINDIDAE

Sphindus dubius Gyll.: Piano Ruggio, p.c., V-IX.

ASPIDIPHORIDAE

Aspidiphorus orbiculatus Gyll.: Duglia, r., VIII; Piano delle Mandre, r., VI.

CISIDAE

Cis boleti Scop.: Acqua Tremola, r., VI; Piano delle Mandre, c., VI; Serra del Prete, pendici nord-est, c., VI-VII; Timpa del Demonio, r., VI; Valle Malvento, c., VIII; Piano Ruggio, c., VI-VIII; Cozzo Dimoniello, c., VI-VIII; Coppola di Paola, pendici nord-est e sud, c., VI-VII; Vallone della Caballa, c., VII;

Cis castaneus Mellié *: Duglia, r., VI;

Cis comptus Gyll.: Campotenese, p.c., VIII;

Cis dentatus Mellié **: Duglia, c., IX; noto di Piemonte, Ticino, Appennino Romagnolo (LUIGIONI, 1929: 498); (M);

Cis hispidus Gyll.: Duglia, c., VIII; Serra del Prete, pendici ovest, c., VI-VIII; Valle Malvento, c., VIII;

Cis lineatocribatus Mellié *: Duglia, r., VII; Serra Dolcedorme, pendici nord-ovest, c., VII; Vacquarro, c., VI; Piano Ruggio, c., VII; Coppola di Paola, pendici nord-est, r., VII;

Cis micans F.: Duglia, 1 ex., VIII; Serra delle Ciavole, pendici sud-est, c., VII; Colle dell'Impiso, r., VI;

Cis nitidus Herbst: Terranova P., c., IX; Duglia, c., VI-IX; Cugno dell'Acero, c., VI-VIII; Pantano Grande, r., VI; Piano Pillino, r., VIII; Colle dell'Impiso, c., VI; Vacquarro, c., VI; Piano Ruggio, c., VIII; Anticristo, r., VI;

Cis setiger Mellié: Duglia, 1 ex., VIII.

Ennearthron affine Gyll.*: Duglia, 1 ex., VII;

Ennearthron cornutum Gyll.*: Coppola di Paola, pendici nord-est, 1 ex., VII; (M).

Octotemnus glabriculus Gyll.: Serra del Prete, pendici ovest, c., VI-VIII.

Rhopalodontus perforatus Gyll.: Piano Ruggio, 1 ex., VI.

Sulcacis bicornis Mellié *: Valloncello di Viggianello, r., VI; Piano Ruggio, r., VI; Anticristo, 1 ex., VI.

Xylographus bostrychoides Duft.*: Campotenese, r., VII.

LYCTIDAE

Trogoxylon impressus Com.: Terranova P., p.c., VI-VII.

BOSTRYCHIDAE

Bostrychus capucinus L.: Cozzo di Visitone, 1 ex., VI.

Rhizoperta dominica F.: Duglia, c., V; Piano delle Mandre, 1 ex., VI; Cugno Ruggeri, 1 ex., V.

Scobicia chevrieri Villa: Terranova P., 1 ex., VII; Piano Ruggio, c., VII.
Sinoxylon sextentatum Ol.: Campotenese, 1 ex., VII.
Stephanopachys quadricollis Mars.**: Cugno Ruggeri, 1 ex., VI; noto di Liguria, Piemonte, Sicilia e Corsica (LUIGIONI, 1929: 640).

ANOBIIDAE

Anobius punctatus Deg.: Piano Pollino, 1 ex., VIII; Coppola di Paola, pendici nord-est, 1 ex., VI.
Caenochara subglobosa Muls.: Acqua Tremola, r., VI; Duglia, c., IX; (M).
Dendrophilus rugicollis Muls.*: Anticristo, 1 ex., VII.
Ernobius longicornis Sturm: Piano Ruggio, r., VI, *leg.* MONTEMURRO;
Ernobius nigrinus Sturm **: Valle Malvento, 1 ex., VI; Piano Ruggio, c., VI; Anticristo, c., VI; noto di Piemonte, Trentino A. Adige, Friuli V. Giulia (LUIGIONI, 1929: 645).
Lasioderma apicatum Muls.*: Cugno Ruggeri, 1 ex., VII;
Lasioderma baudii Schils.: Piano Ruggio, 1 ex., VI;
Lasioderma obscurum Solsky **: Madonna di Pollino, c., VI; Anticristo, c., VI; noto di Toscana, Lazio e Sicilia (LUIGIONI, 1929: 650);
Lasioderma serricorne F.: Terranova P., r., VI; Duglia, 1 ex., VI.
Ochina latreillei Bon.**: Piano Ruggio, 1 ex., VI; noto di Piemonte e Trentino A. Adige (LUIGIONI, 1929: 644); (M).
Oligomerus ptilinoides Woll.: Piano Ruggio, 1 ex., VII; Cozzo di Dimoniello, r., VI.
Ptilinus pecticornis L.: Cugno Ruggeri, 1 ex., VI.
Ptinomorphus imperialis L.: Vacquarro, 1 ex., VII; Piano Ruggio, 1 ex., VI; Coppola di Paola, rif. Rotonda, 1 ex., VI; Fosso Mauro, r., VI;
Ptinomorphus regalis Duft.*: Anticristo, 1 ex., VII.
Stegobium paniceum L.: Piano delle Mandre, r., VI; Piano Ruggio, 1 ex., VI.
Xestobium rufovillosum Deg.: Campotenese, 1 ex., VI.
Xyletinus laticollis Duft.: Serra del Prete, pendici ovest, 1 ex., VII; Timpa del Demonio, 1 ex., VI;
Xyletinus subrotundatus Larey *: Piano Ruggio, r., VI.

PTINIDAE

Ptinus aubei Boield.: Cugno Ruggeri, r., VI;
Ptinus calcaratus Kiesw.*: Campotenese, 1 ex., X;

Ptinus clavipes Panz.: Duglia, 1 ex., VI; Pantano Grande, r., VII;
Ptinus fur L.: Terranova P., c., VI-VII;
Ptinus moori Khnz. (= *latro* auct.): Terranova P., 1 ex., IX; Duglia, r., VIII;
Ptinus obesus Lucas: Vacquarro, r., VI-VII; Piano Ruggio, c., VII;
Ptinus pilosus Muls.*: Colle dell'Impiso, 1 ex., VI;
Ptinus tarsalis Reitt.: Campotenese, 1 ex., 9.VI.1979; ANGELINI & MONTEMURRO (1986, in stampa) lo citano di Policoro (Basilicata) come nuovo per la fauna italiana.

OEDEMERIDAE

Chrysanthia viridissima L.: BOLOGNA, 1976: 29; Valle Malvento, p.c., VI.
Ischnomera cinerascens Pand.: MAGISTRETTI, 1955 b: 1 (sub *Asclera cinerascens* Pand.); Timpa del Demonio, c., VI;
Ischnomera coerulea L.: MAGISTRETTI, 1967: 189 (sub *Asclera coerulea* L.); Timpa del Demonio, 1 ex., VI;
Ischnomera sanguinicollis F.: Duglia, 1 ex., VI; Timpa del Demonio, c., VI.
Oedemera atrata Schmd.: MAGISTRETTI, 1955 b: 2; Valle Malvento, r., VI; Piano Ruggio, 1 ex., VI;
Oedemera brevicollis Schmd.: Terranova P., 1 ex., VI;
Oedemera caudata Seidl.: Campotenese, r., VI-VII;
Oedemera femorata Scop.*: Vallone della Caballa, 1 ex., VII;
Oedemera flavescens L.: Cugno Ruggeri, 1 ex., VI; Pantano Grande, 1 ex., VI;
Oedemera flavipes Ol.: MAGISTRETTI, 1955 b: 2; Valle Malvento, r., VI-VII; Piano Ruggio, r., VI-VII; Anticristo, 1 ex., VI; Campotenese, 1 ex., VII;
Oedemera lurida Marsh.: MAGISTRETTI, 1955 b: 2;
Oedemera melanopyga Schmd.: MAGISTRETTI, 1955 b: 1; Piano Ruggio, 1 ex., VII, *leg.* MONTEMURRO;
Oedemera nobilis Scop.: MAGISTRETTI, 1955 b: 2; Piano Ruggio, c., VI-VII; Anticristo, c., VI-VII; Campotenese, c., VII;
Oedemera podagrariae L.: MAGISTRETTI, 1955 b: 2; Valle Malvento, c., VI; Piano Ruggio, r., VI; Anticristo, 1 ex., VI; Campotenese, p.c., VI;
Oedemera subulata Ol.: MAGISTRETTI, 1955 b: 2; Vacquarro, 1 ex., VI; Valle Malvento, c., VI; Piano Ruggio, 1 ex., VII; Anticristo, c., VI.
Nacerda ruficollis F.: MAGISTRETTI, 1955 b: 1.
Oncomera femorata F.: Acqua Tremola, 1 ex., VI; nota di Piemonte, Veneto, Trentino A. Adige, Friuli V. Giulia, Lazio (MAGISTRETTI, 1967: 100), Sicilia (LUIGIONI, 1929: 661).

PYTHIDAE

Mycterus tibialis Küst.: Duglia, r., VI-VII.
Rhinosimus planirostris F.: Valle Malvento, 1 ex., VI;
Rhinosimus ruficollis L.*: Piano Ruggio, c., VII; (M).
Vincenzellus viridipennis Latr.: GOBBI, 1973: 38; Duglia, p.c., VI-IX.

PYROCHROIDAE

Pyrochroa coccinea L.: Fosso Mauro, 1 ex., VI;
Pyrochroa serraticornis ssp. *kiesenwetteri* Fairm.*: Duglia, r., VI, *leg.* MONTEMURRO.

SCRAPTIIDAE

Scraptia bifoveolata Küst.: Duglia, r., VI;
Scraptia dubia Ol.: Vacquarro, r., VII; Piano Ruggio, r., VI-VII; Anticristo, r., VI.

ADERIDAE

Phytobaeus amabilis Sahlb.**: Coppola di Paola, pendici nord-est, Rifugio Rotonda, 1 ex., VI; LUIGIONI (1929: 667) lo cita di Piemonte.

ANTHICIDAE

Notoxus miles ssp. *italicus* Bucc.: Campotenese, 1 ex., VI;
Notoxus trifasciatus Rossi: strada Terranova P.-Duglia, r., VI; Campotenese, c., VII.
Endomia tenuicollis Rossi: Coppola di Paola, pendici nord-est, 1 ex., VII.
Anthicus niger Ol.: Piano Ruggio, p.c., VI; Anticristo, r., VI-VII;
Anthicus bifasciatus Rossi: Vacquarro, 1 ex., VII;
Anthicus laeviceps Baudi: strada Terranova P.-Duglia, r., VII;
Anthicus antherinus L.: BUCCIARELLI, 1961: 124.
Hirticomus quadriguttatus Rossi: Campotenese, r., VII;

Hirticomus hispidus Rossi: Acqua Tremola, c., VI; Cugno dell'Acero, 1 ex., V.
Omonadus floralis L.: Cozzo di Dimoniello, c., VI-VIII; Pedarreto, r., VI; Anticristo, c., VI.
Stricticomus tobias Mars.*: Campotenese, 1 ex., VI.
Formicomus pedestris Rossi: strada Terranova P.-Duglia, r., VI; Pedarreto, r., VI.
Microhoria fasciata Chevr.: Colle dell'Impiso, r., VI; Valle Malvento, c., VI; Piano Ruggio, c., VI-VII; Fosso Mauro, r., VI-VII; Vallone della Caballa, c., VII;
Microhoria terminata Schmd.: Acqua Tremola, r., VI;
Microhoria raveli Pic.: BUCCIARELLI, 1980: 215; Valle Malvento, 1 ex., VI; Piano Ruggio, 1 ex., VI.

MELOIDAE

Cerocoma schaefferi L.: Campotenese, r., VI.
Lytta vesicatoria L.: MAGISTRETTI, 1955 b: 3.
Meloe brevicollis Panz.: MAGISTRETTI, 1955 b: 3.
Mylabris fabricii Sum.: MAGISTRETTI, 1955 b: 3 (sub *M. decempunctata* F.); Piano Pollino, c., VI; Vacquarro, p.c., VI-VII; Colle Gaudolino, c., VII; Piano Ruggio, r., VII; Coppola di Paola, pendici sud, c., VII; Colle del Dragone, r., VII; Anticristo, 1 ex., VII;
Mylabris flexuosa Ol.: MAGISTRETTI, 1953: 39; Colle del Dragone, r., VII;
Mylabris variabilis Pall.: MAGISTRETTI, 1953: 43; Colle Gaudolino, r., VII; Anticristo, 1 ex., VII.
Zonitis immaculata Ol.: MAGISTRETTI, 1955 b: 4; Anticristo, 1 ex., VII;
Zonitis nana Rag.: MAGISTRETTI, 1955 b: 4;
Zonitis praeusta F.: MAGISTRETTI, 1955 b: 4.

MORDELLIDAE

Anaspis flava L.: FRANCISCOLO, 1956: 7; Cozzo Dimoniello, p.c., VI;
Anaspis frontalis L.: Piano Ruggio, r., VII;
Anaspis lurida Steph.: Anticristo, c., VI; Campotenese, r., VII;
Anaspis maculata Fourcr.: Cugno dell'Acero, r., VI-VII;
Anaspis melanostoma Costa: FRANCISCOLO, 1956: 6;
Anaspis nigripes Bris.: Valle Malvento, r., VII;
Anaspis pulicaria Costa: FRANCISCOLO, 1956: 5; Piano Ruggio, c., VI; Campotenese, 1 ex., VII;

Anaspis ruficollis F.: FRANCISCOLO, 1956: 5;
Anaspis serbica Apfelb.*: Valle Malvento, r., VI-VII; Piano Ruggio, c., VI;
Anaspis subtestacea Steph.: FRANCISCOLO, 1956: 6;
Anaspis thoracica L.: FRANCISCOLO, 1956: 6; Valle Malvento, r., VI;
Anaspis varians Muls.: FRANCISCOLO, 1956: 7; Pendici nord-ovest di Serra Dolcedorme, r., VII; Piano Ruggio, 1 ex., VII; Anticristo, 1 ex., VII;
Anaspis viennensis Schilsky: PORTA, 1959: 218; (M).
Mediimorda bipunctata Germ.: FRANCISCOLO, 1956: 3 (sub *Mordella bipunctata* Germ.); Terranova P., 1 ex., VI.
Mordella holomelaena Apfelb.**: Duglia, 1 ex., VII; Colle Gaudolino, r., VII; Serra del Prete, pendici nord-est, r., VII; PORTA (1959: 208) la cita del Veneto (Venezia);
Mordella leucaspis Küst.*: Anticristo, r., VII; Campotenese, c., VII;
Mordella meridionalis Méq.: FRANCISCOLO, 1956: 2;
Mordella purpurascens Apfelb.: FRANCISCOLO, 1956: 3.
Mordellistena brevicauda Boh.: FRANCISCOLO, 1956: 3;
Mordellistena emeryi Schl.: FRANCISCOLO, 1956: 4 (sub *M. confinis* var. *emeryi* Schl.); Acqua Tremola, r., VII; Anticristo, 1 ex., VII;
Mordellistena episternalis Muls.: FRANCISCOLO, 1956: 5;
Mordellistena micans Germ.: FRANCISCOLO, 1956: 4;
Mordellistena micantoides Erm.**: Campotenese, 1 ex., VI; PORTA (1959: 214) la cita di Alto Adige;
Mordellistena minima Costa: Cozzo di Visitone, c., VI; Valle Malvento, r., VI; Piano Ruggio, 1 ex., VI; Fosso Mauro, Coppola di Paola, c., VI-VII;
Mordellistena parvula Gyll.: FRANCISCOLO, 1956: 5;
Mordellistena pseudohirtipes Erm.**: Piano Ruggio, c., VI; ANGELINI & MONTEMURRO (1986, in stampa) lo citano di Policoro (Basilicata) come presumibilmente nuovo per la fauna italiana.
Mordellistena pumila Gyll.: FRANCISCOLO, 1956: 4; Piano Ruggio, 1 ex., VI; Colle del Dragone, r., VI;
Mordellistena stenidea Muls.: FRANCISCOLO, 1956: 4.
Mordellistenula perrisi Muls.**: Campotenese, 1 ex., VII; LUIGIONI (1929: 688) lo cita di Campania e Sicilia, PORTA (1959: 208) di Toscana, I. Giglio e Sardegna.
Tomoxia biguttata Gyll.: FRANCISCOLO, 1956: 2.
Variimorda fasciata F.: FRANCISCOLO, 1956: 3 (sub *Mordella fasciata* F.); Terranova P., c., VII; Duglia, p.c., VI; Piano Toscano, r., VI; Cozzo Dimoniello, r., VII; Pedareto, c., VIII; Anticristo, c., VII-VIII; Campotenese, r., VII.

MELANDRYIDAE

Abdera quadrifasciata Curt.*: Campotenese, c., VII.

Orchesia undulata Kr.: GOBBI, 1973: 39; Coppola di Paola, rif. Rotonda, pendici nord-est, 1 ex., VI.

Osphya bipunctata F.: Timpa del Demonio, c., VI; Valle Malvento, 1 ex., VI; Piano Ruggio, r., VI; Cozzo Dimoniello, p.c., VI; Fosso Mauro, r., VI; Pedarreto, r., VI; Anticristo, c., VI.

Phloeotrya vaudoueri Muls.*: Coppola di Paola, pendici nord-est, 1 ex., VIII; Anticristo, 1 ex., VII.

Serropalpus barbatus Schall.: GOBBI, 1973: 39; Serra del Prete, pendici nord-est, 1 ex., VII.

LAGRIIDAE

Lagria atripes Muls.: Piano Ruggio, p.c., VI-VIII;

Lagria hirta L.: Duglia, p.c., VI-VIII; Piano Pollino, c., VIII; Cozzo di Visitone, c., V; Valle Malvento, r., VI-VII; Piano Ruggio, c., VI-VIII; Cozzo Dimoniello, r., VI; Campotenese, c., VI-VII.

ALLECULIDAE

Cteniopus flavus Scop.: Duglia, r., VII; Anticristo, c., VI.

Gonodera luperus Herbst: MAGISTRETTI, 1955 b: 4; Piano Pollino, c., VI-VII; Timpa del Demonio, p.c., VI; Anticristo, p.c., VI; Campotenese, p.c., VII;

Gonodera luperus f. *ferruginea* F.: Piano Pollino, c., VI; Fontana di Rummo, r., VI; Vacquarro, r., VI; Timpa del Demonio, c., VI; Piano Ruggio, r., VI; Fosso Mauro, r., VI; Campotenese, c., VI-VII;

Gonodera metallica Küst.: Timpa del Demonio, c., VI; Anticristo, c., VI; Campotenese, c., VI.

Isomira icteropa Küst.**: Piano Pollino, c., VII; Timpa del Demonio, c., VI; Valle Malvento, r., VI; Piano Ruggio, r., VI; Coppola di Paola, pendici nord-est; noto di Trentino A. Adige (LUIGIONI, 1929: 700);

Isomira marcida Kiesw.: Piano Toscano, p.c., VI; Vacquarro, r., VI; Timpa del Demonio, c., VI; Fosso Mauro, c., VI;

Isomira murina L.: MAGISTRETTI, 1955 b: 5;

Isomira testacea Seidl.: Anticristo, r., V-VII.

Megischia curvipes Brullé: MAGISTRETTI, 1955 b: 5.
Megischina armillata Brullé: MAGISTRETTI, 1955 b: 5.
Odontomophlus flavipennis Küst.*: Campotenese, 1 ex., VII;
Odontomophlus lepturoides F.: MAGISTRETTI, 1955 b: 5 (sub *Omophlus lepturoides* F.); Acqua Tremola, c., VI; Pantano Grande, r., VI; Valle Malvento, c., VI-VII; Piano Ruggio, c., VI-VII.
Omophlus dispar Costa: MAGISTRETTI, 1955 b: 5;
Omophlus picipes F.: MAGISTRETTI, 1955 b: 5; Valle Malvento, 1 ex., VI;
Omophlus rufitarsis Leske: Piani Ruggio, 1 ex., VI; Fosso Mauro, 1 ex., VI.
Podonta italica Baudi: MAGISTRETTI, 1962: 89; Terranova P., 1 ex., VI.
Pseudocistela ceramboides L.: MAGISTRETTI, 1955 b: 4; Cozzo di Dimoniello, 1 ex., VI.

TENEBRIONIDAE

Alphitobius diaperinus Panz.: Piano Ruggio, 1 ex., VII, *leg.* e *coll.* MONTEMURRO.
Asida bayardi Sol.: GRIDELLI, 1956 b: 1; Vacquarro, r., VII; (M).
Blaps gibba Cast.: GRIDELLI, 1956 b: 1; Campotenese, 1 ex., VI;
Blaps lethifera Marsh.: GRIDELLI, 1956 b: 2.
Bolitophagus interruptus Ill.: Duglia, c., V-IX; Canale di Malevento, r., VII; Piano Ruggio, c., V-VIII; Fosso di Mauro, r., VI; Coppo di Paola, pendi sud e nord-est, c., VII;
Bolitophagus reticulatus L.: GRIDELLI, 1956 b: 3; Duglia, c., V-IX; Cugno dell'Acero, r., VI-VII; Colle Gaudolino, r., VI; Vacquarro, c., VI; Valle Malvento, c., VI-VIII.
Colpotus strigosus Costa: GARDINI, 1975 b: 677.
Dendarus lugens Muls.: GRIDELLI, 1956 b: 2;
Dendarus dalmatinus Germ.: CANZONERI, 1977: 242.
Diaperis boleti L.: GRIDELLI, 1956 b: 3; Piano delle Mandre, 1 ex., VII; Cozzo di Dimoniello, 1 ex., VI.
Enoplopus dentipes Rossi: GRIDELLI, 1956 b: 4; Duglia, c., IX; Serra del Prete, pendici nord-est, p.c., VI.
Gnathocerus cornutus F.: Terranova P., 1 ex., VI.
Gonocephalum pusillum F.: Piano Ruggio, c., VII; Pedarreto, r., VII; Anticristo, c., VI-VII.
Helops coeruleus L.: GRIDELLI, 1956 b: 5 (sub *Anteros coeruleus* L.); Duglia, p.c., IX.
Hoplocephala haemorrhoidalis F.: GRIDELLI, 1956 b: 3; Duglia, c., VI-IX; Pedarreto, p.c., VI-VII.

Hypophloeus bicolor Ol.: strada Terranova P.-Duglia, r., VI;
Hypophloeus fasciatus F.*: Acqua Tremola, 1 ex., VI;
Hypophloeus unicolor Piller: Duglia, c., VI-VIII; Cugno Ruggeri, p.c., VI-IX; Vacquarro, c., VI-VII; Valle Malvento, p.c., VI; Coppola di Paola, pendici nord-est, c., VI-VII; Anticristo, c., VI.
Iphthimus italicus Truqui *: Valle Malvento, 1 ex., VII.
Menephilus cylindricus Herbst *: Terranova P., r., VII.
Nalassus dryadophilus Muls.: GRIDELLI, 1956 b: 5; Duglia, c., IX; Pantano Grande, r., VI; Fontana di Rummo, r., VI;
Nalassus planipennis Küst.: Campotenese, r., VII.
Neatus noctivagus Muls.: CANZONERI, 1977: 243.
Opatrum sabulosum L.: Duglia, 1 ex., V, *leg.* MONTEMURRO;
Opatrum verrucosum Germ.: GRIDELLI, 1956 b: 2; Piano Ruggio, 1 ex., VI.
Palorus depressus F.: Piano Ruggio, c., VI-VII; Coppola di Paola, pendici sud, r., VII.
Pedinus meridianus Muls.: GRIDELLI, 1956 b: 2; Piano Pollino, 1 ex., VI; Piano Ruggio, r., VII; Anticristo, c., VI.
Scaphidema metallicum F.: Duglia, c., VIII, *leg.* DE MARZO; Serra del Prete, pendici nord-est, r., VII.
Stenomax lanipes L.*: Duglia, p.c., V; Piano delle Mandre, 1 ex., VI.
Stenosis brenthoides Rossi: GRIDELLI, 1956 b: 1 (sub *S. intermedia sicula* Sol.).
Tenebrio molitor L.: Campotenese, p.c., VI;
Tenebrio obscurus F.: GRIDELLI, 1956 b: 4.
Uloma culinaris L.: GRIDELLI, 1956 b: 4; Piano Ruggio, 1 ex., VI; Coppola di Paola, pendici sud, r., VI-VII.

SCARABAEIDAE

Amphimallon fuscum Scop.*: MIKSIC, 1959: 15 (sub *Rhizotrogus fuscus* Scop.); Duglia, 1 ex., VI;
Amphimallon solstitiale L.*: Anticristo, r., VII.
Anoxia scutellaris Muls.: ALIQUÒ & MASSA, 1976: 154.
Anisoplia monticola ssp. *neapolitana* Reitt.: MIKSIC, 1959: 16; Pedarreto, 1 ex., VI; Campotenese, r., VII;
Anisoplia tempestiva Er.: MIKSIC, 1959: 18.
Aphodius beduinus Reitt.: Valle Malvento, r., VIII;
Aphodius borealis Gyll.: CARPANETO, 1974 b: 39; PIEROTTI, 1977: 188;
Aphodius carpetanus ssp. *siculus* Har.: CARPANETO, 1974 a: 11 (sub *A. siculus* Har.); PIEROTTI, 1977: 178;

Aphodius conjugatus Panz.: PIEROTTI, 1977: 188; Duglia, r., IX; Piano Pollino, p.c., VIII; Piano Ruggio, 1 ex., IX;
Aphodius corvinus Er.: PIEROTTI, 1977: 191; (M);
Aphodius conspurcatus L.: PITTINO, 1979: 34; (M);
Aphodius consputus Creutz.: Duglia, r., V;
Aphodius contaminatus Herbst: PIEROTTI, 1977: 183; Duglia, r., IX; Piano delle Mandre, p.c., IX; Pantano Grande, c., IX;
Aphodius depressus Kug.: MARIANI, 1971: 233; (M);
Aphodius erraticus L.: MIKSIC, 1959: 8; PIEROTTI, 1977: 174; Colle Gaudolino, r., VI; Piano Ruggio, p.c., VI;
Aphodius fasciatus Ol.*: Anticristo, r., VII;
Aphodius fimetarius L.: MIKSIC, 1959: 9; PIEROTTI, 1977: 187; Duglia, c., IX;
Aphodius foetidus Herbst: MIKSIC, 1959: 9; PIEROTTI, 1977: 188 (sub *A. scybalarius* F.);
Aphodius fossor L.: MIKSIC, 1959: 8; MARIANI, 1971: 230; PIEROTTI, 1977: 175; Piano Ruggio, 1 ex., VII; Anticristo, r., VII;
Aphodius granarius L.: MIKSIC, 1959: 19; PIEROTTI, 1977: 192; Duglia, r., VI; Colle Gaudolino, p.c., VI; Serra del Prete, pendici nord-est, r., VI;
Aphodius haemorrhoidalis L.: PIEROTTI, 1977: 176; Piano Ruggio, 1 ex., VII;
Aphodius ictericus Laich: PIEROTTI, 1977: 189 (sub *A. nitidulus* F.); Colle Gaudolino, r., VII;
Aphodius immundus Creutz.: PIEROTTI, 1977: 190; Duglia, 1 ex., VIII, *leg.* DE MARZO;
Aphodius laticollis Baudi: MARIANI, 1971: 233;
Aphodius lugens Creutz.: CARPANETO, 1974 b: 42; PIEROTTI, 1977: 189;
Aphodius niger Panz.: MIKSIC, 1959: 10; PIEROTTI, 1977: 191;
Aphodius obscurus F.: BAUDI, PICCIOLI & CAVANNA, 1882: 70; MIKSIC, 1959: 9; MARIANI, 1971: 242; PIEROTTI, 1977: 184; Piano Ruggio, r., VI-VII;
Aphodius porcus F.: PIEROTTI, 1977: 185;
Aphodius pusillus Herbst: PIEROTTI, 1977: 186; Campotenese, 1 ex., IX;
Aphodius ragusae Reitt.: PIEROTTI, 1976: 37; 1977: 185; Duglia, 1 ex., IX;
Aphodius rufipes L.: MARIANI, 1971: 231; PIEROTTI, 1977: 177; Piano Pollino, r., VII; Colle Gaudolino, p.c., VII; Timpa del Demonio, 1 ex., VI;
Aphodius scybalarius F.: MIKSIC, 1959: 9; PIEROTTI, 1977: 190 (sub *A. rufus* Moll.); Duglia, c., IX;
Aphodius schlumbergeri ssp. *samniticus* J. Dan.: BAUDI, PICCIOLI & CAVANNA, 1882: 70 (sub *A. discus* Schmdt.); MIKSIC, 1959: 8 (sub *A. mixtus* Vill.); MARIANI, 1971: 235; PIEROTTI, 1977: 180; (M);

Aphodius scrutator Herbst: MIKSIC, 1959: 8; PIEROTTI, 1977: 174; Colle Gaudolino, c., VII; Pedarreto, r., VII;
Aphodius sphacelatus Panz.*: Duglia, 1 ex., V;
Aphodius sticticus Panz.: MARIANI, 1971: 241;
Aphodius sturmi Har.: Coppola di Paola, pendici nord-est, 1 ex., VII;
Aphodius zenkeri Germ.: MIKSIC, 1959: 9.
Caccobius schreberi L.: MIKSIC, 1959: 5; Terranova P., r., VI-VII; Campotenese, 1 ex., VII.
Cetonia aurata ssp. *pisana* Curt.: MIKSIC, 1959: 21; Duglia, p.c., VII; Piano Pollino, r., VII; Colle Gaudolino, p.c., VII; Serra del Prete, pendici ovest, r., VI-VII; Anticristo, c., VI-VII.
Chironitis furcifer Rossi: MIKSIC, 1959: 4.
Copris lunaris L.: MIKSIC, 1959: 4;
Copris umbilicatus Ab.: MIKSIC, 1959: 4; (M).
Epicometis hirta Poda: MIKSIC, 1959: 20; Valle Malvento, c., VII; Piano Ruggio, p.c., VI-VII; Anticristo, c., VII.
Euheptaulacus carinatus ssp. *brutius* Luig.: MIKSIC, 1959: 10; MARIANI, 1971: 250; Piano Ruggio, r., VII; Anticristo, r., VIII.
Euoniticellus fulvus Goeze: MIKSIC, 1959: 4; Piano Ruggio, 1 ex., VII.
Geotrupes niger Marsh.: MIKSIC, 1959: 7; Anticristo, 1 ex., VII;
Geotrupes spiniger Marsh.: MIKSIC, 1959: 6; Pedarreto, p.c., VI;
Geotrupes stercorosus Scriba: MIKSIC, 1959: 7; Valle Malvento, c., VI; Coppola di Paola, pendici nord-est, 1 ex., VII;
Geotrupes vernalis ssp. *apenninicus* Mar.: MARIANI, 1958: 31.
Gnorimus nobilis L.: MIKSIC, 1959: 19; Serra del Prete, pendici ovest, r., VII; Piano Ruggio, c., VII; Colle del Dragone, r., VII; Anticristo, m.c., VII.
Gymnopleurus geoffroyi Fuessl.: MIKSIC, 1959: 2; (M);
Gymnopleurus mopsus Pall.: MIKSIC, 1959: 2;
Gymnopleurus sturmi M. Leay: MIKSIC, 1959: 2; Duglia, r., VI.
Haplidia sp.?: MIKSIC, 1959: 11.
Homaloplia marginata Fuessl.: MIKSIC, 1959: 11;
Homaloplia nicolasi Bar.*: Piano Ruggio, 1 ex., VI; Anticristo, 1 ex., VII; (M).
Hoplia argentea Poda: MIKSIC, 1959: 18; Timpa del Demonio, c., VI; Anticristo, r., VI;
Hoplia minuta Panz.: Anticristo, 1 ex., VI.
Mimela junii n. *calabrica* Machat: MIKSIC, 1959: 15; Anticristo, r., VII.
Onthophagus amyntas Ol.: MIKSIC, 1959: 5;
Onthophagus fracticornis Preys.: MIKSIC, 1959: 6; MARIANI, 1971: 229;
Onthophagus furcatus F.: Duglia, 1 ex., IX; Piano delle Mandre, p.c., VIII;
Onthophagus grossepunctatus Reitt.: MIKSIC, 1959: 5;

Onthophagus illyricus Scop.: MIKSIC, 1959: 5;
Onthophagus joannae Golj.: BINAGHI & A. A., 1969: 38;
Onthophagus lemur F.: MIKSIC, 1959: 6; Piano delle Mandre, r., VI; Piano Ruggio, 1 ex., VII;
Onthophagus maki Ill.: CARPANETO, 1974 b: 46;
Onthophagus opacicollis Reitt.: Terranova P., 1 ex., X; Duglia, r., X;
Onthophagus ruficapillus Brullé: BINAGHI & A. A., 1969: 40;
Onthophagus taurus Schreb.: MIKSIC, 1959: 5; Duglia, r., VI-VII;
Onthophagus vacca L.: MIKSIC, 1959: 6; Piano Ruggio, 1 ex., VII; Colle del Dragone, r., VII; Anticristo, p.c., VII;
Onthophagus verticicornis Laich: MIKSIC, 1959: 6; Anticristo, r., VI.
Oryctes nasicornis v. *laevigatus* Heer: Terranova P., 1 ex., VII.
Oxythyrea funesta Poda: MIKSIC, 1959: 20; Duglia, p.c., VII; Pantano Grande, 1 ex., VII; Pedarreto, c., VII.
Pentodon bidens ssp. *punctatum* Vill.: MIKSIC, 1959: 18 (sub *P. punctatus* Vill.); Campotenese, 1 ex., VII.
Pleurophorus caesus Creutz.: Duglia, c., VIII, *leg.* DE MARZO; Cugno Ruggeri, c., VI-VII.
Polyphilla fullo ssp. *macrocera* Reitt.: MAGRONE & PAPINI, 1966: 38; (M).
Protaelia cuprea F.: MIKSIC, 1959: 21 (sub *Potosia cuprea* F.); Anticristo, p.c., VII;
Protaelia morio F.: MIKSIC, 1959: 22 (sub *Potosia morio* F.); Campotenese, r., VII.
Rhizotrogus aestivus Ol.: MIKSIC, 1959: 14; Colle dell'Impiso, 1 ex., VI;
Rhizotrogus marginipes Muls.: Piano Pollino, 1 ex., VI.
Scarabaeus semipuctatus F.: Coppola di Paola, rif. Rotonda, 1 ex., VI;
Scarabaeus typhon Fish.: MIKSIC, 1959: 1 (sub *S. affinis* Brullé); Campotenese, 1 ex., VII;
Scarabaeus variolosus F.: MIKSIC, 1959: 2; Anticristo, 1 ex., VII.
Sisyphus schaefferi L.: MIKSIC, 1959: 4; Piano Ruggio, r., VII.
Trichius fasciatus L.: BAUDI, PICCIOLI & CAVANNA, 1882: 70; MIKSIC, 1959: 19; Duglia, c., VIII; Piano Pollino, r., VIII; Colle Gaudolino, 1 ex., VII; Vacquarro, c., VII; Piano Ruggio, c., VII; Anticristo, c., VII;
Trichius sexualis Bed.: MIKSIC, 1959: 20; (M);
Trichius zonatus Germ.: MIKSIC, 1959: 19; Timpa del Demonio, r., VI-VII; Piano Ruggio, c., VII; Coppola di Paola, pendici nord-est, r., VII; Anticristo, c., VII.
Tropinota squalida Scop.: MIKSIC, 1959: 20.
Trox hispidus Pont.: MIKSIC, 1959: 11.
Typhoeus typhoeus L.: Campotenese, 1 ex., VI.

Valgus hemipterus L.: MIKSIC, 1959: 19; Piano Ruggio, r., VI; Anticristo, c., VI-VII.

LUCANIDAE

Dorcus parallelepipedus L.: BAUDI, PICCIOLI & CAVANNA, 1882: 69; MIKSIC, 1959: 22; Cugno Ruggeri, r., VI.

Lucanus tetraodon Thunbg.: MIKSIC, 1959: 22; Campotenese, 1 ex., VII.

Platycerus caprea Deg.: MIKSIC, 1959: 22;

Platycerus caraboides L.: MIKSIC, 1959: 23; Piano Pollino, r., VI; Serra del Prete, pendici nord-est, p.c., VI-VII.

Sinodendron cylindricum L.: MIKSIC, 1959: 23; Pantano Grande, p.c., VI-VIII; Vacquarro, c., VI; Valle Malvento, c., VIII; Piano Ruggio, p.c., VI-VIII.

CERAMBYCIDAE

Acanthocinus reticulatus Razoum: TASSI, 1966 b: 40; Piano Ruggio, 1 ex., VII, *leg.* MONTEMURRO; (M);

Acanthocinus xanthoneurus Muls.: TASSI, 1966 b: 42; Piano Ruggio, 1 ex., VII, *leg.* PARENZAN; Anticristo, p.c., VI.

Acanthoderes clavipes Schrank: TASSI, 1966 b: 40; Terranova P., 1 ex., VII.

Acmaeops collaris L.: TASSI, 1966 b: 9; Duglia, c., VI; Cugno dell'Acero, c., VI; Timpa del Demonio, p.c., VI; Valle Malvento, 1 ex., VI.

Agapanthia cardui L.: TASSI, 1966 b: 46; Terranova P., r., VI; Anticristo, p.c., VI; Campotenese, c., VI-VII;

Agapanthia cynarae Germ.: TASSI, 1959: 45; Terranova P., 1 ex., VI;

Agapanthia villosoviridiscens Deg.: TASSI, 1966 b: 45; Vacquarro, 1 ex., VII; Anticristo, 1 ex., VII;

Agapanthia violacea F.: TASSI, 1966 b: 44.

Anaestetis testacea F.: TASSI, 1966 b: 38; Campotenese, c., VII.

Anaglyptus gibbosus F.: TASSI, 1966 b: 32; Timpa del Demonio, 1 ex., VI; Valle Zaperna, 1 ex., VI;

Anaglyptus mysticus L.: TASSI, 1959: 32; Timpa del Demonio, 1 ex., VI.

Aromia moscata ssp. *ambrosiaca* Stev.: TASSI, 1966 b: 20.

Asemum striatum L.: TASSI, 1966 b: 14.

Axinopalpis gracilis Kr.**: Campotenese, 1 ex., VII; noto di Toscana, Romagna e Gargano (LUIGIONI, 1929: 737).

Brachypteroma ottomanum Heyd.: TASSI, 1966 b: 19; Pantano Grande, r., VI; Duglia, 1 ex., VI, *leg.* MONTEMURRO.
Calamobius filum Rossi: TASSI, 1966 b: 39; Terranova P., r., VI.
Callidium aeneum Deg.: TASSI, 1966 b: 24.
Cerambix cerdo L.: TASSI, 1966 b: 16;
Cerambix scopoli Füssly: Terranova P., r., VI;
Cerambix velutinus Brullé: Terranova P., r., VII.
Chlorophorus figuratus Scop.: TASSI, 1966 b: 30; Anticristo, 1 ex., VII;
Chlorophorus sartor ssp. *infensus* Plav.: TASSI, 1966 b: 30; Duglia, r., VI-VII; Pantano Grande, p.c., VI-VII; Timpa del Demonio, p.c., VI;
Chlorophorus trifasciatus F.: TASSI, 1966 b: 31.
Clytus arietis L.: TASSI, 1966 b: 27; Vacquarro, 1 ex., VI; Valle Malvento, r., VI; Piano Ruggio, c., VI; Fosso Mauro, p.c., VI; Coppola di Paola, rif. Rotonda, p.c., VI; Anticristo, 1 ex., VII;
Clytus rhamni ssp. *bellieri* Gautier: TASSI, 1966 b: 27; Campotenese, 1 ex., VI.
Cortodera aspromontana Müll.: TASSI, 1966 b: 9; Timpa del Demonio, 1 ex., VI.
Criocephalus ferus Muls.: Coppola di Paola, pendici nord-est, 1 ex., VI.
Deilus fugax Ol.: TASSI, 1966 b: 20; Terranova P., c., VI; Campotenese, 1 ex., VII.
Dorcadion etruscum Rossi: TASSI, 1966 b: 35; Terranova P., 1 ex., VI.
Dorcatypus tristis L.: TASSI, 1966 b: 38.
Ergates faber Serv.: TASSI, 1972: 386.
Gracilia minuta F.: Anticristo, 1 ex., VII; Campotenese, r., VII.
Grammoptera ruficornis F.: TASSI, 1966 b: 10; Terranova P., c., VI; Anticristo, p.c., VI; Campotenese, 1 ex., VII;
Grammoptera ustulata Schall.: TASSI, 1966 b: 10.
Hylotrupes bajulus L.: TASSI, 1966 b: 23; Pantano Grande, 1 ex., VII.
Judolia erratica Dalm.: TASSI, 1966 b: 12; Cugno Ruggeri, c., VI; Campotenese, 1 ex., VII.
Leptura cordigera Füssly: TASSI, 1966 b: 11; Campotenese, c., VII;
Leptura dubia Scop.: TASSI, 1970: 103; (M);
Leptura fulva Dej.: TASSI, 1966 b: 11;
Leptura livida ssp. *pecta* J. & K. Dan: TASSI, 1966 b: 12; Terranova P., p.c., VI; Pantano Grande, p.c., VI; Timpa del Demonio, p.c., VI; Valle Malvento, c., VI; Piano Ruggio, c., VI-VII; Anticristo, c., VI-VIII; Campotenese, c., VII;
Leptura rubra L.*: Duglia, 1 ex., VII; Anticristo, p.c., VI;
Leptura sanguinolenta L.: TASSI, 1972: 387;
Leptura scutellata F.: TASSI, 1966 b: 11; Duglia, 1 ex., VII.

Liopus nebulosus L.: TASSI, 1966 b: 44; Campotenese, c., VII.
Molorchus umbellatarum Schreb.: TASSI, 1966 b: 19.
Morimus asper Sulz.: Acqua Tremola, 1 ex., VI; Duglia, p.c., VI-VII; Cugno Ruggeri, r., VII; Fontana di Rummo, p.c., VI-VII; Colle dell'Impiso, r., VII; Vacquarro, c., VI-VII; Valle Malvento, c., VII; Piano Ruggio, c., VI-VII; Coppola di Paola, pendici sud e nord-est, p.c., VI-VIII; Anticristo, c., VII.
Oberea oculata L.: TASSI, 1966 b: 46.
Phymatodes alni L.: TASSI, 1966 b: 25; Duglia, p.c., VI;
Phymatodes testaceus L.: TASSI, 1966 b: 24; Campotenese, p.c., VI-VII.
Phytoecia coerulea Scop.: Valle Malvento, r., VI; Fosso Mauro, 1 ex., VI;
Phytoecia coerulescens Scop.: TASSI, 1966 b: 47.
Pidonia lurida F.*: Duglia, 1 ex., VI, *leg.* MONTEMURRO; (M).
Plagionotus arcuatus L.: TASSI, 1966 b: 29; Pedarreto, 1 ex., VI; Anticristo, 1 ex., VII;
Plagionotus scalaris Brullé: TASSI, 1966 b: 30; Terranova P., r., VI.
Pogonocherus eugeniae Ganglb.: TASSI, 1966 b: 38; Piano Ruggio, 1 ex., VIII, *leg.* PARENZAN; (M).
Prionus coriarius L.: TASSI, 1966 b: 2; Coppola di Paola, pendici sud, 1 ex., VII; Anticristo, r., VII.
Purpuricenus kaehleri L.: TASSI, 1966 b: 33; Terranova P., 1 ex., VI.
Rhagium bifasciatum F.: TASSI, 1966 b: 3; Duglia, r., VI-VII; Valle di Malevento, 1 ex., VI;
Rhagium inquisitor L.: TASSI, 1966 b: 4; Duglia, c., IX; Valle di Malevento, 1 ex., VI;
Rhagium mordax Dej.: TASSI, 1966 b: 3; Piano Pollino, 1 ex., VI; Coppola di Paola, rif. Rotonda, pendici nord-est, r., VII;
Rhagium sycophanta Schrank: Piano Pollino, 1 ex., VI, *leg.* MONTEMURRO.
Rhamnusium graecum ssp. *italicum* Müll.: TASSI, 1966 b: 4; Duglia, 1 ex., VI, *leg.* e *coll.* MONTEMURRO; (E).
Rosalia alpina L.: TASSI, 1966 b: 21; Cugno Ruggeri, r., VIII; Piano delle Mandre, 1 ex., VIII.
Stenochorus meridianus L.: Piano Ruggio, 1 ex., VII, *leg.* e *coll.* MONTEMURRO.
Stenopterus ater L.: TASSI, 1966 b: 18; Acqua Tremola, r., VI; Pantano Grande, 1 ex., VII; Anticristo, r., VI-VII;
Stenopterus flavicornis Küst.: TASSI, 1966 b: 18;
Stenopterus rufus L.: TASSI, 1966 b: 17; Terranova P., c., VI; Pantano Grande, r., VI; Anticristo, c., VI-VII; Campotenese, r., VII.
Strangalia aurulenta F.: TASSI, 1966 b: 13;

Strangalia bifasciata Müll.: TASSI, 1966 b: 14; Terranova P., 1 ex., VI; Valle di Malevento, r., VI; Piano Ruggio, r., VI-VIII;
Strangalia maculata Poda: Cozzo Dimoniello, r., VII; Anticristo, r., VII;
Strangalia melanura L.: TASSI, 1966 b: 13; Duglia, c., VIII; Piano Ruggio, c., VI-VIII; Campotenese, c., VI-VII;
Strangalia nigra L.: TASSI, 1966 b: 14; Campotenese, 1 ex., VI.
Stromatium fulvum Vill.: TASSI, 1966 b: 16.
Tetrops praeusta L.: TASSI, 1966 b: 47.
Trichoferus cinereus Vill.: TASSI, 1966 b: 15;
Trichoferus griseus F.: TASSI, 1966 b: 15; Piano Ruggio, p.c., VII; Coppola di Paola, pendici nord-est, 1 ex., VI.
Xylotrechus arvicola Ol.: TASSI, 1966 b: 26; Acqua Tremola, 1 ex., VI;
Xylotrechus rusticus L.: TASSI, 1966 b: 26.

CHRYSOMELIDAE

Antipa biguttata Ol.*: Duglia, 1 ex., VI; Anticristo, r., VI.
Cassida prasima Ill.: Piano Ruggio, p.c., VI; (M);
Cassida vibex L.: Vacquarro, r., VII; Fosso Mauro, 1 ex., VII.
Chilotoma italica Leoni *: Valle Malvento, 1 ex., VI; Piano Ruggio, c., VI; Anticristo, c., VI; Campotenese, r., VI.
Chrysolina cerealis ssp. *mixta* Küst.: MAGISTRETTI & RUFFO, 1960: 156; Piano Pollino, r., VI; (M);
Chrysolina cribrosa ssp. *sirentensis* Meier: MAGISTRETTI & RUFFO, 1960: 152 (sub *Chrysomela cribosa* ssp. *sirentensis* Meier);
Chrysolina fastuosa Scop.: BAUDI, PICCIOLI & CAVANNA, 1882: 79; MAGISTRETTI & RUFFO, 1960: 163 (sub *Chrysomela fastuosa* Scop.); Piano Pollino, c., VI; Piano Toscano, c., VI; Serra del Prete, pendici nord-est, c., VI-VII; Coppola di Paola, pendici sud, c., VII; Colle del Dragone, c., VII;
Chrysolina grossa F.: Duglia, c., VII-IX; Pantano Grande, 1 ex., VIII; Lago Fondo, r., VIII;
Chrysolina hyperici Först.: Duglia, 1 ex., VII;
Chrysolina lurida L.: MAGISTRETTI & RUFFO, 1960: 158 (sub *Chrysomela lurida* L.); (M);
Chrysolina lutea Pet.: MAGISTRETTI & RUFFO, 1960: 160 (sub *Chrysomela lutea* Pet.); Terranova P., r., VI;
Chrysolina rossia Ill.: Acqua Tremola, p.c., VII;

Chrysolina vernalis ssp. *italica* Weise: MAGISTRETTI & RUFFO, 1960: 156 (sub *Chrysomela vernalis italica* Weise); Pantano Grande, 1 ex., VI.

Chrysomela populi L.: Duglia, c., VIII; Campotenese, c., VI-VII.

Clytra laeviuscula Ratzb.*: Anticristo, 1 ex., VII; (M);

Clytra quadripunctata ssp. *appendicina* Lac.: Duglia, r., VI, *leg.* MONTEMURRO.

Coptocephala unifasciata Scop.: Piano Pollino, r., VI; Piano Toscano, c., VI-VII; Vacquarro, r., VI.

Crioceris duodecimpunctata L.: RUFFO, 1964 a: 80; Campotenese, r., VII;

Crioceris macilenta Rossi: RUFFO, 1964 a: 85;

Crioceris paracenthensis L.: RUFFO, 1964 a: 78; Terranova P., r., VI; Campotenese, 1 ex., VII.

Cryptocephalus aureolus Suffr.: BURLINI, 1955: 101; Piano Toscano, 1 ex., VII;

Cryptocephalus connexus Ol.*: Vacquarro, r., VI;

Cryptocephalus czwalinae Weise: BURLINI, 1955: 190;

Cryptocephalus flavipes F.: BURLINI, 1955: 170; Timpa del Demonio, c., VI; Valle Malvento, r., VI;

Cryptocephalus fulvus Goeze: BURLINI, 1955: 210; Valle Malvento, c., VI-VII; Piano Ruggio, c., VII; Anticristo, c., VII;

Cryptocephalus hypochoeridis ssp. *falzonii* Burl.: BURLINI, 1955: 108; molto comune ovunque, V-VII;

Cryptocephalus ilicis Ol.: BURLINI, 1955: 74; Anticristo, r., VII;

Cryptocephalus imperialis Laich.: BURLINI, 1955: 80; (M);

Cryptocephalus labiatus L.: Acqua Tremola, r., VI; Duglia, 1 ex., VI; Pantano Grande, p.c., VI;

Cryptocephalus leonhardi Breit.: Piano Pollino, c., VI; Vacquarro, c., VI; Valle Malvento, c., VI; Piano Ruggio, r., VI-VII; Fosso Mauro, r., VII; Anticristo, c., VI;

Cryptocephalus macellus Suffr.: BURLINI, 1955: 223;

Cryptocephalus marginatus F.: BURLINI, 1955: 138;

Cryptocephalus moraei L.: Piano Ruggio, 1 ex., VI, *leg.* MONTEMURRO;

Cryptocephalus nitidus L.: BURLINI, 1955: 127; Duglia, 1 ex., VI;

Cryptocephalus ocellatus Drap.: Fontana Rummo, 1 ex., VI; Vacquarro, c., VI; Colle dell'Impiso, p.c., VI-VII;

Cryptocephalus rugicollis Ol.: BURLINI, 1955: 96; Piano Ruggio, c., VI; Anticristo, c., VI;

Cryptocephalus scapularis Suffr.: BURLINI, 1955: 194; Piano Ruggio, c., VII; Coppola di Paola, pendici sud, r., VII;

Cryptocephalus sericeus ssp. *zambanellus* Mars.: Piano Ruggio, r., VI; Coppola di Paola, pendici sud, p.c., VI;

Cryptocephalus tricolor Rossi: BURLINI, 1955: 39; Timpa del Demonio, c., VI;

Cryptocephalus trimaculatus Rossi: BURLINI, 1955: 81; Terranova P., 1 ex., VII;

Cryptocephalus vittula Suffr.: FOCARILE, 1978: 59.

Donacia simplex F.: Fosso Mauro, r., VII; (M).

Exosoma lusitanicum L.: Terranova P., c., VI; Timpa del Demonio, r., VI; Pedarreto, c., VI-VIII; Anticristo, p.c., VI-VII; Campotenese, r., VI-VII.

Galeruca tanaceti L.: BAUDI, PICCIOLI & CAVANNA, 1882: 80; Acqua Tremola, 1 ex., VII; Piano Ruggio, r., VI-VII; Anticristo, 1 ex., VII; Campotenese, r., VI-VII.

Galerucella luteola Müll.: Valle Malvento, c. VI; Fosso Mauro, r., VI;

Galerucella solarii Burl.*: Duglia, c., VIII; Vacquarro, c., VII; Valle Malvento, c., VI; Fosso Mauro, r., VI.

Gastrophysa polygoni L.: Campotenese, p.c., VI-VII.

Hypocassida subferruginea Schrnk.: Cozzo di Dimoniello, 1 ex., VI.

Labidostomis longimana L.: REGALIN, 1980: 42; Campotenese, 1 ex., VII; Piano Ruggio, 1 ex., VI, *leg.* MONTEMURRO;

Labidostomis pallidipennis Gebl.: REGALIN, 1980: 45;

Labidostomis taxicornis F.: REGALIN, 1980: 40; Terranova P., c., VI.

Lachnaea italica Weise: Timpa del Demonio, r., VI; Cozzo Dimoniello, r., VII; Campotenese, c., VII.

Lema melanopa L.: RUFFO, 1964 a: 77; Timpa del Demonio, c., VI; Valle Zaperna, 1 ex., VI; Valle Malvento, r., VI; Piano Ruggio, c., VII.

Lilioceris lilii Scop.: Campotenese, r., VII.

Lochmaea crataegi Först.: Acqua Tremola, c., VI; Vacquarro, c., VI; Timpa del Demonio, r., VI; Piano Ruggio, r., VI.

Luperus biraghii Rag.: FOGATO, 1978: 58;

Luperus leonardii Fog.: FOGATO, 1978: 46.

Macrolenes dentipes Ol.: Campotenese, c., VII.

Oreina cacaliae ssp. *magistrettii* Schatzm.: BAUDI, PICCIOLI & CAVANNA, 1882: 80 (sub *Chrysomela cacaliae* var. *senecionis* Schum.); MAGISTRETTI & RUFFO, 1960: 165 (sub *Chrysochloa cacaliae* ssp. *magistrettii* Schatzm.); Piano Pollino, c., VI; Piano Toscano, r., VI; Fontana Rummo, c., VI-VII; Serra del Prete, pendici nord-est e ovest, c., VI-VII; Vacquarro, p.c., VI-VII; Valloncello di Viggianello, r., VII; Timpa del Demonio, 1 ex., VI; Valle Malvento, c., VI-VII; Piano Ruggio, p.c., VI; Anticristo, 1 ex., VI; (M);

Oreina marsicana Luig.: BAUDI, PICCIOLI & CAVANNA, 1882: 79 (sub *Chrysomela gloriosa* F.); MAGISTRETTI & RUFFO, 1960: 164 (sub *Chrysocloa*

marsicana Luig.); Fontana Rummo, r., VI-VII; Vallone della Caballa, r., VII; (M).

Orsodacne lineola Panz.: Cozzo di Visitone, 1 ex., VI; Anticristo, r., VII.

Pachybrachis exclusus ssp. *etruscus* Weise: BURLINI, 1968: 72; Duglia, c., VI-VII; Vacquarro, 1 ex., VI; Piano Ruggio, r., VI;

Pachybrachis fimbriolatus Suffr.: BURLINI, 1968: 92; (M);

Pachybrachis ruffoi Burl.: BURLINI, 1956: 4; Duglia, 1 ex., VII;

Pachybrachis salfii Burl.: BURLINI, 1956: 1; (M).

Phaedon cochleariae F.: Campotenese, c., VI.

Phratora vitellinae L.*: Acqua Tremola, r., VI; Duglia, c., VI-VIII; Lago Fondo, r., VI; Fontana Rummo, p.c., VI; Vacquarro, c., VI-VII; Piano Zaperna, p.c., VI-VII; Vallone della Caballa, r., VI; (M);

Phratora laticollis Suffr.*: Duglia, r., VI; Vallone della Caballa, 1 ex., VI; Campotenese, c., VI-VII.

Plagiodera versicolora Laich.: Vacquarro, c., VI; Timpa del Demonio, c., VII; Piano Ruggio, r., VII.

Sclerophaedon orbicularis Suffr.*: Vallone Zaperna, r., VII; Piano Ruggio, c., VI; Fosso Mauro, c., VI.

Smaragdina affinis Hellow: Duglia, 1 ex., VI, *leg.* MONTEMURRO;

Smaragdina aurita L.*: Campotenese, r., VII;

Smaragdina concolor F.*: Serra delle Ciavole, pendici sud-est, c., VI; Piano Toscano, r., VI; Timpa del Demonio, c., VI; Canale Malvento, c., VI; Piano Ruggio, r., VI; Fosso Mauro, p.c., VI; Anticristo, r., VI;

Smaragdina cyanea F.: Piano Ruggio, r., VI; Fosso Mauro, r., VI.

Timarcha pimelioides H.S.: Coppola di Paola, rif. Rotonda, 1 ex., VI;

Timarcha tenebricosa ssp. *nicaensis* Villa: MINELLI & VITTORELLI, 1976: 1-33; Duglia, 1 ex., VII.

Altica oleracea L.: Terranova P., r., V.

Aphthona carbonaria Rosenh.: Terranova P., r., VI-VII;

Aphthona euphorbiae Schrnk.: Anticristo, r., VI; Campotenese, r., VI;

Aphthona nigriceps Redtb.: Terranova P., 1 ex., VI;

Aphthona venustula Kutsch.: Piano Ruggio, 1 ex., VI.

Argopus ahrensi Germ.: RUFFO, 1964 b: 102; (M).

Chaetocnema hortensis Geoffr.: Vallone Zaperna, c., VI; Fosso Mauro, p.c., VI;

Chaetocnema tibialis Ill.: Fontana Rummo, 1 ex., VII; Vacquarro, 1 ex., VI.

Chalcoides aurata Marsh.: strada Terranova P.-Duglia, r., VI-VII; Acqua Tremola, 1 ex., VI;

Chalcoides aurea Geoffr.: Duglia, 1 ex., VII.

Crepidodera brevicollis Dan.: Duglia, 1 ex., VI;

Crepidodera ferruginea Scop.: Fosso Mauro, p.c., VI;
Crepidodera transversa Marsh.*: Campotenese, r., VI-VII; (M).
Dibolia cryptocephala Koch: Duglia, r., VIII; (M).
Epithrix atropae Foudr.*: Piano Ruggio, 1 ex., VI, *leg.* MONTEMURRO; (M).
Longitarsus exoletus L.: Valle Malvento, 1 ex., VI;
Longitarsus luridus Scop.: Terranova P., p.c., V-VII;
Longitarsus nervosus Woll.*: Valle Malvento, 1 ex., VI;
Longitarsus parvulus Payk.: Anticristo, c., VI; Campotenese, c., VI;
Longitarsus pellucidus Foudr.: Valle Malvento, 1 ex., VI; Piano Ruggio, 1 ex., VI;
Longitarsus suturalis Marsh.: Timpa del Demonio, c., VI; Piano Ruggio, c., VI;
Longitarsus suturellus Duf.: Vacquarro, 1 ex., VI, *leg.* MONTEMURRO.
Ochrosis ventralis Ill.: Piano Pollino, 1 ex., VII; Colle dell'Impiso, c., VI; Vacquarro, c., VI; Vallone Zaperna, p.c., VI; Valle Malvento, c., VI; Vallone della Caballa, r., VI.
Phyllotreta nigripes F.: Duglia, 1 ex., IX; Vallone e Piano Zaperna, r., VI; Valle Malvento, c., VI; Piano Ruggio, c., VI.
Podagrica malvae Ill.: Duglia, p.c., VI-VII.
Psylliodes chalcomera Ill.: LEONARDI, 1975: 64; Terranova P., r., VII;
Psylliodes crysocephala var. *collaris* Weise: LEONARDI, 1975: 57;
Psylliodes cuprea Koch: LEONARDI, 1971: 532; 1975: 54; Anticristo, r., VII;
Psylliodes instabilis Foudr.: Vacquarro, 1 ex., VI;
Psylliodes kiesenwetteri Kütsch.: LEONARDI, 1975: 77; Vacquarro, 1 ex., VI; Piano Ruggio, c., VII;
Psylliodes luteola Müll.: LEONARDI, 1972: 145; 1975: 68;
Psylliodes napi F.: LEONARDI, 1975: 52; Duglia, 1 ex., VII;
Psylliodes obscuroaenea Rosh.: LEONARDI, 1975: 68;
Psylliodes picina ssp. *laevifrons* Kütsch.: LEONARDI, 1975: 67;
Psylliodes ruffoi Leon.: LEONARDI, 1975: 77; Campotenese, 1 ex., VI.
Sphaeroderma rubidum Graells.: RUFFO, 1964 b: 97.

BRUCHIDAE

Bruchidius canus Gyll.: ZAMPETTI, 1982: 398; Piano Ruggio, 1 ex., V;
Bruchidius cisti F.: Campotenese, r., VII;
Bruchidius foveolatus Gyll.: Vacquarro, c., VI-VII; Piano Ruggio, r., VI;
Bruchidius gilvus Gyll.*: Valle Malvento, c., VI; Piano Ruggio, 1 ex., VI; Vallone della Caballa, c., VII;

Bruchidius marginalis F.*: Duglia, 1 ex., VI; (M);
Bruchidius meleagrinus Gené: Campotenese, r., VI;
Bruchidius murinus Boh.: Valle Malvento, c., VI; Piano Ruggio, r., VI;
Bruchidius nanus Germ:. Fontana Rummo, c., VI; Madonna di Pollino, 1 ex., VI; Vacquarro, c., VI;
Bruchidius pygmaeus Boh.**: Anticristo, c., VI; Campotenese, r., VII; noto di I. Ustica e Malta (LUIGIONI, 1929: 848);
Bruchidius seminarius L.: Anticristo, c., VII; Campotenese, c., VI;
Bruchidius sericatus Germ.: Acqua Tremola, c., VI; Duglia, 1 ex., VI;
Bruchidius tarsalis Gyll.*: Vallone di Zaperna, 1 ex., VI; Cozzo di Dimoniello, 1 ex., VI; noto di Liguria, Piemonte, Lazio e Sardegna (LUIGIONI, 1929: 847).
Bruchus brachialis F.: Campotenese, r., VII;
Bruchus loti Payk.*: Piano Ruggio, 1 ex., VI;
Bruchus rufimanus Boh.: Piano Ruggio, r., VII; Coppola di Paola, pendici nord-est, r., VII;
Bruchus rufipes Herbst: strada Terranova P.-Duglia, r., VI; Anticristo, 1 ex., VI.
Spermophagus sericeus Geoffr.: Duglia, 1 ex., VIII, *leg.* DE MARZO; Valle Malvento, r., VIII.

ANTHRIBIDAE

Anthribus albinus L.: GOBBI, 1973: 39; Duglia, 1 ex., VIII; Coppola di Paola, pendici sud, 1 ex., VII.
Brachytarsus fasciatus Först.*: Campotenese, 1 ex., VII.
Phaenotherion fasciculatum Reitt.: GOBBI, 1973: 39; Cugno Ruggeri, r., VII.
Platyrrhinus resinosus Scop.: GOBBI, 1973: 39; Coppola di Paola, pendici sud, 1 ex., VII.
Tropideres niveirostris F.*: Duglia, 1 ex., VIII, *leg.* DE MARZO.

SCOLYTIDAE

Crypturgus pusillus Gyll.: MASUTTI, 1968: 218; (M).
Ernoporus fagi F.**: Vacquarro, 1 ex., VI; Piano Ruggio, r., VI, *leg.* MONTEMURRO; App. Ligure, Piemonte, Alpi Venete, App. Emiliano, App. Toscano, App. Romano (LUIGIONI, 1929: 997).
Hylastes angustatus Herbst *: Piano Ruggio, 1 ex., VI, *leg.* MONTEMURRO.
Ips acuminatus Gyll.: MASUTTI, 1968: 218; (M);
Ips sexdentatus Börner: MASUTTI, 1968: 217; Cugno Ruggeri, r., VII.

Orthotomicus laricis F.: Coppola di Paola, pendici nord-est, rif. Rotonda, 1 ex., VI; Piano Ruggio, 1 ex., VI;
Orthotomicus suturalis Gyll.**: Duglia, p.c., IX; Piemonte, Lombardia, Trentino A. Adige, Toscana (LUIGIONI, 1929: 1002); (M).
Pityogenes bidentatus Herbst: MASUTTI, 1968: 218;
Pityogenes bistridentatus Eichh.: MASUTTI, 1968: 218;
Pityogenes trepanatus Nördl.: MASUTTI, 1968: 218.
Pityokteines curvidens Germ.**: Duglia, 1 ex., IX; noto di Piemonte, Toscana (LUIGIONI, 1929: 1001); (M).
Pityophthorus lichtensteini Ratzb.: MASUTTI, 1968: 218; (M).
Polygraphus grandiclava Thoms.**: Piano Pollino, c., VI, *leg.* MONTEMURRO; Trentino A. Adige (LUIGIONI, 1929: 995); (M).
Scolytus rugulosus Müll.*: Terranova P., 1 ex., VII.
Taphrorynchus bicolor Herbst: GOBBI, 1973: 40; Duglia, m.c., V-IX; Valle Malvento, r., VI; Piano Ruggio, c., VI; Coppola di Paola, pendici nord-est, c., VI; Anticristo, c., VI-VII.
Trypodendron lineatum Ol.: GOBBI, 1973: 40; (M).
Xyleborus monographus F.: Coppola di Paola, pendici nord-est, c., VII.
Xylocleptes bispinus Duft.: Piano Ruggio, r., VII, *leg.* MONTEMURRO.
Xyloterus domesticus L.*: Duglia, r., IX; Piano Ruggio, r., VII;
Xyloterus signatus F.*: Duglia, c., V-IX.

NEMONYCHIDAE

Nemonyx lepturoides F.*: Campotenese, 1 ex., VI, *leg.* COLONNELLI (COLONNELLI i.l.); Piemonte, Lombardia, Toscana, Umbria, Lazio (LUIGIONI, 1929: 989); (M).

ATTELABIDAE

Apoderus coryli L.: MAGNANO, 1957: 4; Duglia, r., VI.
Attelabus nitens Scop.: MAGNANO, 1957: 4; Campotenese, 1 ex., VI.

RHYNCHITIDAE

Auletobius politus Serv.: MAGNANO, 1957: 2.
Byctiscus betulae L.: COLONNELLI, 1974: 118; Piano delle Mandre, r., VI; Anticristo, p.c., VI;

Byctiscus populi L.: COLONNELLI, 1974: 119.
Coenorrhinus aequatus L.: MAGNANO, 1957: 3; COLONNELLI, 1974: 118; Vallone Zaperna, r., VI; Valle della Caballa, p.c., VI-VII;
Coenorrhinus pauxillus Germ.: MAGNANO, 1957: 3; COLONNELLI, 1974: 118; Timpa del Demonio, 1 ex., VI.
Deporaus seminiger Reitt.: MAGNANO, 1957: 4 (sub *Conostropheus tristis* F.); COLONNELLI, 1974: 119; Vacquarro, 1 ex., VI; Piano Ruggio, r., VI.
Involvulus coeruleus Deg.: MAGNANO, 1957: 3; COLONNELLI, 1974: 118.
Lasiorhynchites praeustus Boh.: COLONNELLI, 1974: 117; Terranova P., r., VI; Anticristo, 1 ex., VI;
Lasiorhynchites sericeus Herbst: MAGNANO, 1957: 2.
Pselaphorynchites nanus Payk.: MAGNANO, 1957: 2;
Pselaphorynchites tomentosus Gyll.: COLONNELLI, 1974: 117; Vacquarro, r., VI; Valle della Caballa, r., VI.
Pseudocoenorrhinus germanicus Herbst: MAGNANO, 1957: 2; COLONNELLI, 1974: 117; Piano Ruggio, 1 ex., VI, *leg.* MONTEMURRO;
Pseudocoenorrhinus interpunctatus Steph.: MAGNANO, 1957: 3.
Rhynchites bacchus L.: MAGNANO, 1957: 3; COLONNELLI, 1974: 118; Piano Toscano, r., VI;
Rhynchites versicolor Costa: Campotenese, 1 ex., VII.

APIONIDAE

Apion aeneum F.: MAGNANO, 1957: 6; COLONNELLI, 1957: 120; Coppola di Paola, pendici nord-est, p.c., VI;
Apion aethiops Herbst: MAGNANO, 1957: 10;
Apion alcyoneum Germ.**: Piano Ruggio, 1 ex., VI; Duglia, 1 ex., VI, *leg.* COLONNELLI (COLONNELLI i.l.); citato di Sicilia da LUIGIONI (1929: 978); COLONNELLI (i.l.) lo ha reperito anche nel Veneto (Cadore, Pelos [BL], VIII.1972);
Apion antennale Desbr.: MAGNANO, 1957: 11;
Apion apricans Herbst: MAGNANO, 1957: 14; Valle Malvento, p.c., VI; Cozzo di Visitone, r., VI;
Apion assimile Kirby: MAGNANO, 1957: 15;
Apion astragali Payk.: COLONNELLI, 1974: 127; Cugno Ruggeri, r., VII; Pantano Grande, p.c., VI;
Apion atomarium Kirby: COLONNNELLI, 1974: 122 (sub *A. vicinum* Kirby);
Apion brevirostre Gyll.: MAGNANO, 1957: 4; COLONNELLI, 1974: 119; Duglia, r., VII; Valle della Caballa, 1 ex., VI;
Apion carduorum Kirby: MAGNANO, 1957: 9; COLONNELLI, 1974: 123; Piano

Ruggio, p.c., VI; Valle della Caballa, 1 ex., VI; Colle del Dragone, c., VI-VII;

Apion cerdo Gerst.: COLONNELLI, 1974: 126;

Apion cognatum Hochh.*: Vacquarro, p.c., VIII, *leg.* COLONNELLI (COLONNELLI i.l.);

Apion craccae L.: COLONNELLI, 1974: 126;

Apion cruentatum Waltl.*: Duglia, p.c., VII;

Apion curtirostre Germ.: MAGNANO, 1957: 5; COLONNELLI, 1974: 120; Duglia, r., VI; Piano delle Mandre, 1 ex., VI; Valle Malvento, r., VI; Piano Ruggio, p.c., VI-VII;

Apion damryi Desbr.: COLONNELLI, 1974: 123; (M);

Apion dentipes Gerst.: MAGNANO, 1957: 15; Colle Gaudolino, 1 ex., VI;

Apion dichroum Bed.: MAGNANO, 1957: 13; COLONNELLI, 1974: 127 (sub *flavipes* Payk.); Duglia, 1 ex., VIII; Piano delle Mandre, r., VI; Valle Malvento, 1 ex., VII; Valle della Caballa, 1 ex., VI;

Apion dispar Germ.: Terranova P., c., VI; Acqua Tremola, r., VI;

Apion dissimile Germ.: MAGNANO, 1957: 15; Campotenese, 1 ex., VII;

Apion elegantulum Germ.: COLONNELLI, 1974: 127;

Apion elongatulum Desbr.: COLONNELLI, 1974: 121; (M);

Apion ervi Kirby: COLONNELLI, 1974: 126;

Apion facetum Gyll.: Duglia, 1 ex., VI, *leg.* COLONNELLI (COLONNELLI i.l.);

Apion fallens Desbr.: COLONNELLI, 1974: 123;

Apion filicorne Wenck.: MAGNANO, 1957: 11; Valle Malvento, 1 ex., VIII;

Apion flavifemoratum Herbst: MAGNANO, 1957: 10; COLONNELLI, 1957: 124; Duglia, 1 ex., V; Valle Malvento, 1 ex., VI; Piano Ruggio, p.c., VI;

Apion formaneki Wagn.: COLONNELLI, 1974: 121; (M);

Apion foveatoscutellatum Wagn.: MAGNANO, 1957: 6;

Apion fuscirostre F.: COLONNELLI, 1974: 121;

Apion gavoyi Desbr.: COLONNELLI, 1974: 125; (M);

Apion gracicolle Gyll.: COLONNELLI, 1974: 124; Duglia, r., VI-VII;

Apion gyllenhali Kirby: MAGNANO, 1957: 10; COLONNELLI, 1974: 124; Duglia, 1 ex., VI; Piano Pollino, r., VI-VII;

Apion haematodes Kirby: MAGNANO, 1957: 7 (sub *frumentarium* Payk.); Campotenese, c., VII;

Apion hydrolapathi Marsh.: MAGNANO, 1957: 5; Piano Pollino, r., VI;

Apion ilvense Wagn.: Piano Ruggio, 1 ex., VI; Anticristo, c., VI-VII;

Apion immune Kirby: MAGNANO, 1957: 10; COLONNELLI, 1974: 124; Vacquarro, r., VI-VII;

Apion interjectum Desbr.: MAGNANO, 1957: 14; COLONNELLI, 1974: 128; Valle Malvento, r., VI; Anticristo, r., VII;

Apion juniperi Boh.: MAGNANO, 1957: 11; (M);
Apion laevicolle Kirby: MAGNANO, 1957: 14;
Apion leucopheatum Wenck.: MAGNANO, 1957: 7;
Apion loti Kirby: Cugno Ruggeri, r., VI; Vacquarro, r., VI; Valle Malvento, c., VI; Piano Ruggio, r., VI;
Apion malvae F.: MAGNANO, 1957: 5; Anticristo, r., VI;
Apion melancholicum Wenck.: COLONNELLI, 1974: 126;
Apion minimum Herbst: MAGNANO, 1957: 7; COLONNELLI, 1974: 121; Duglia, 1 ex., VIII; Valle Malvento, p.c., VI;
Apion nigritarse Kirby: MAGNANO, 1957: 13; COLONNELLI, 1974: 127; Piano delle Mandre, p.c., VI; Cozzo di Visitone, r., VI; Valle Malvento, 1 ex., VI; Piano Ruggio, r., VI; Colle del Dragone, 1 ex., VII;
Apion ochropus Germ.: COLONNELLI, 1974: 126; Piano Ruggio, 1 ex., VI;
Apion ononicola Bach.: Terranova P., 1 ex., VI;
Apion ononis Kirby: MAGNANO, 1957: 12;
Apion onopordi Kirby: MAGNANO, 1957: 8; COLONNELLI, 1974: 123;
Apion opeticum Bach.: MAGNANO, 1957: 12; (M);
Apion penetrans Germ.: MAGNANO, 1957: 9;
Apion perraudieri ssp. *falzonii* Schatzm.: MAGNANO, 1957: 9; Duglia, r., VI, *leg.* MONTEMURRO; Vacquarro, r., VI, *leg.* SACCO (COLONNELLI i.l.);
Apion pisi F.: MAGNANO, 1957: 10; COLONNELLI, 1974: 124; Piano Toscano, r., VI; Timpa del Demonio, 1 ex., VI; Vacquarro, r., VI; Colle del Dragone, r., VI-VII; Anticristo, p.c., VI-VII;
Apion pomonae F.: MAGNANO, 1957: 13; COLONNELLI, 1974: 126; Acqua Tremola, 1 ex., VI;
Apion pseudocerdo Dieckm.: Duglia, 2 exx., VI, *leg.* COLONNELLI (COLONNELLI i.l.);
Apion pubescens Kirby: Piano Ruggio, 1 ex., VII;
Apion punctigerum Payk.: Piano Ruggio, 1 ex., VI;
Apion radiolus Kirby: MAGNANO, 1957: 6; COLONNELLI, 1974: 120;
Apion reflexum Gyll.: MAGNANO, 1957: 11; Valle Malvento, 1 ex., VI;
Apion ruficroides Schatzm.: Fontana Rummo, r., VI; Fosso Mauro, r., VI-VII; Anticristo, c., VI;
Apion rufirostre F.: MAGNANO, 1957: 5; Campotenese, p.c., VI-VII;
Apion schoenherri Boh.*: Cugno Ruggeri, 1 ex., VII;
Apion semivittatum Gyll.: MAGNANO, 1957: 7; COLONNELLI, 1974: 121;
Apion seniculum Kirby: MAGNANO, 1957: 8; COLONNELLI, 1974: 122; Duglia, 1 ex., IX; Pantano Grande, r., VI; Piano Pollino, 1 ex., VI; Colle del Dragone, r., VI-VIII; Anticristo, 1 ex., VII;

Apion seriatosetosulum Wenck.: MAGNANO, 1957: 8; COLONNELLI, 1974: 122;
Apion simum Germ.: COLONNELLI, 1974: 120;
Apion spencei Kirby: MAGNANO, 1957: 11;
Apion stolidum Germ.: MAGNANO, 1957: 8; Campotenese, 1 ex., VII; (M);
Apion tenue Kirby: MAGNANO, 1957: 9; Acqua Tremola, 1 ex., VI; Campotenese, r., VI;
Apion trifolii L.: MAGNANO, 1957: 14; COLONNELLI, 1974: 128 (sub *A. aestivum* Germ., COLONNELLI i.l.); Anticristo, r., VII; Campotenese, c., VII;
Apion urticarium Herbst: MAGNANO, 1957: 7; COLONNELLI, 1974: 122;
Apion viciae Payk.: MAGNANO, 1957: 12; COLONNELLI, 1974: 125; Valle Malvento, r., VI;
Apion violaceum Kirby: COLONNELLI, 1974: 119; Piano Pollino, 1 ex., VII; Piano Toscano, r., VI; Colle Gaudolino, 1 ex., VI; Campotenese, c., VII;
Apion virens Herbst: MAGNANO, 1957: 13; COLONNELLI, 1974: 127; Duglia, 1 ex., VIII;
Apion vorax Herbst: MAGNANO, 1957: 12; COLONNELLI, 1974: 125; Duglia, r., VII; Piano delle Mandre, 1 ex., VI.
Nanophyes nitidulus Gyll.: Terranova P., r., VI.

CURCULIONIDAE

Acalles aubei Boh.: COLONNELLI, 1974: 163;
Acalles camelus F.: COLONNELLI, 1974: 164; Coppola di Paola, pendici nord-est, 1 ex., VI;
Acalles fausti Meyer *: Cugno dell'Acero, VI, *leg.* COLONNELLI; Vacquarro, VIII, *leg.* COLONNELLI (COLONNELLI i.l.); Emilia, Abruzzo, Lazio, Campania (LUIGIONI, 1929: 925); (M);
Acalles lemur Germ.: COLONNELLI, 1974: 165; Duglia, 1 ex., VIII;
Acalles luigionii Sol.: COLONNELLI, 1974: 163; Coppola di Paola, rif. Rotonda, pendici nord-est, 1 ex., VI; Vacquarro, r., VI; (M);
Acalles parvulus Boh.: COLONNNELLI, 1974: 165; (M);
Acalles saccoi Col.: COLONNELLI, 1972: 25-30; COLONNELLI, 1974: 163; Piano Ruggio, 1 ex., VII, *leg.* MONTEMURRO; (E).
Acallocrates minutesquamosus Reiche: COLONNELLI, 1974: 165 (sub *Acalles denticollis* Germ.); 1980: 12; Vacquarro, 1 ex., VI; Piano Ruggio, r., VII.
Amalus haemorrhous Herbst: MAGNANO, 1957: 49; (M);
Anthonomus chevrolati Desbr.: MAGNANO, 1957: 42; (M);
Anthonomus kirschi Desbr.: COLONNELLI, 1974: 154; (M);

Anthonomus pedicularius L.: MAGNANO, 1957: 42; COLONNELLI, 1974: 154; Valle della Caballa, r., VI;

Anthonomus pomorum L.: COLONNELLI, 1974: 155; strada Terranova P.-Duglia, 1 ex., VI;

Anthonomus rubi Herbst: MAGNANO, 1957: 42; COLONNELLI, 1974: 155; Fontana Rummo, r., VI; Vacquarro, 1 ex., VI; Piano Ruggio, c., VI-VII.

Argoptochus schwarzi Reitt.: MAGNANO, 1957: 25; COLONNELLI, 1974: 136; Piano Ruggio, r., VI.

Auchmerestes kiesenwetteri Kraatz: MAGNANO, 1957: 38; COLONNELLI, 1974: 146.

Baris kaufmanni Reitt.: COLONNELLI, 1974: 166; Duglia, 1 ex., IX; (M);

Baris timida Rossi: MAGNANO, 1957: 45; Campotenese, r., VI-VII.

Barynotus obscurus F.: MAGNANO, 1957: 30; COLONNELLI, 1974: 141; Piano Ruggio, 1 ex., VI; Colle del Dragone, r., VI;

Barynotus solarii Main.: MAGNANO, 1957: 30; COLONNELLI, 1974: 141; (M).

Brachytemnus porcatus Germ.: COLONNELLI, 1974: 149.

Bradybatus creutzeri Germ.: Campotenese, r., VI, su Acero, *leg.* COLONNELLI (COLONNELLI i.l.).

Calosirus terminatus Herbst: MAGNANO, 1957: 47.

Camptorrhynus statua Rossi: COLONNELLI, 1974: 162; Terranova P., r., VI.

Ceutorhynchus atomus Boh.: COLONNELLI, 1974: 170; Valle Malvento, 1 ex., VI;

Ceutorhynchus angustus Dieckm. & Smrezc.***: Serra delle Ciavole, VI, *leg.* e *coll.* COLONNELLI (COLONNELLI i.l.); specie nuova per la fauna d'Italia, nota di varie nazioni europee e Anatolia; COLONNELLI (i.l.) per l'Italia la conosce anche di Valle d'Aosta, Piemonte, Veneto, Abruzzo; (M);

Ceutorhynchus barbareae Suffr.: MAGNANO, 1957: 48; COLONNELLI, 1974: 171; (M);

Ceutorhynchus chalybaeus Germ.: MAGNANO, 1957: 49 (sub *C. timidus* Weise); COLONNELLI, 1974: 171; Anticristo, 1 ex., VI;

Ceutorhynchus consputus Germ.: COLONNELLI, 1974: 169;

Ceutorhynchus contractus Marsh.: MAGNANO, 1957: 49; Acqua Tremola, r., VI; Piano Toscano, 1 ex., VII; Colle Gaudolino, r., VII;

Ceutorhynchus distinctus Bris.: MAGNANO, 1957: 48 (sub *C. marginatus* Payk.);

Ceutorhynchus duvali Bris.: MAGNANO, 1957: 48; COLONNELLI, 1974: 170; Valle di Malevento, 1 ex., VII;

Ceutorhynchus erysimi F.: MAGNANO, 1957: 48; Piano Ruggio, p.c., VI; Coppola di Paola, pendici sud, r., VII;

Ceutorhynchus fallax Boh.: Cugno Acero, 1 ex., VII, *leg.* COLONNELLI (COLONNELLI i.l.);

Ceutorhynchus floralis Payk.: MAGNANO, 1957: 47 (sub *Neocalosirus floralis* Payk.);
Ceutorhynchus hirtulus Germ.: COLONNELLI, 1974: 171 (sub sp. prope *chalilibaeus* Germ., COLONNELLI i.l.);
Ceutorhynchus inaffectatus Gyll.: MAGNANO, 1957: 48; Valle Malvento, r., VI;
Ceutorhynchus laetus Rosh.: COLONNELLI, 1974: 171; (M);
Ceutorhynchus maculaalba Herbst: Campotenese, VI, *leg.* COLONNELLI (COLONNELLI i.l.);
Ceutorhynchus picitarsis Gyll.: Colle del Dragone, 1 ex., VI; Vallone della Caballa, 1 ex., VI;
Ceutorhynchus pleurostigma Marsh.: COLONNELLI, 1974: 170; Anticristo, r., VI-VII; Campotenese, 1 ex., VII;
Ceutorhynchus punctiger Gyll.: dint. Torno, 1 ex., VII, *leg.* COLONNELLI (COLONNELLI i.l.);
Ceutorhynchus sulcicollis Payk.: COLONNELLI, 1974: 170; Valle Malvento, 1 ex., VI; Piano Ruggio, 1 ex., VI; Anticristo, 1 ex., VI;
Ceutorhynchus unguicularis Thoms.: COLONNELLI, 1974: 170; (M).
Cionus balianii Sol.: MAGNANO, 1957: 51; (M);
Cionus hortulanus Geoffr.: MAGNANO, 1957: 51; COLONNELLI, 1974: 173; Colle del Dragone, r., VII; Anticristo, 1 ex., VI;
Cionus longicollis ssp. *montanus* Wingelm.: MAGNANO, 1957: 51; COLONNELLI, 1974: 173; Fontana Rummo, r., VII; Valle Zaperna, 1 ex., VII;
Cionus olens F.: MAGNANO, 1957: 52; COLONNELLI, 1974: 174;
Cionus thapsi F.: MAGNANO, 1957: 52; Campotenese, 1 ex., VII;
Cionus schoenherri Bris.: COLONNELLI, 1974: 173; (M);
Cionus tuberculosus Scop.: MAGNANO, 1957: 51; COLONNELLI, 1974: 173; Piano Ruggio, r., VI; Colle del Dragone, 1 ex., VII.
Cleonis pigra Scop.: MAGNANO, 1957: 37; Piano Ruggio, c., VI.
Cleopus solani F.: MAGNANO, 1957: 52; (M).
Cotaster uncipes Boh.: COLONNELLI, 1974: 147; Vacquarro, r., VI; Valle Malvento, c., VI; Piano Ruggio, 1 ex., VI; Coppola di Paola, rif. Rotonda, pendici nord-est, c., VI.
Curculio crux F.: COLONNELLI, 1974: 155; Duglia, 1 ex., VIII; (M);
Curculio glandium Marsh.: MAGNANO, 1957: 42; Terranova P., 1 ex., VI; Campotenese, r., VI;
Curculio nucum L.: Terranova P., 1 ex., VII;
Curculio pellitus Boh.: Duglia, 1 ex., VI;
Curculio pyrrhoceras Marsh.: MAGNANO, 1957: 42; COLONNELLI, 1974; 156; Campotenese, 1 ex., VII;
Curculio salicivorus Payk.: COLONNELLI, 1974: 156; Vacquarro, r., VI;

Curculio villosus F.: COLONNELLI, 1974: 155; (M).
Datonychus urticae ssp. *stachydis* Faust.: MAGNANO, 1957: 47; dint. Torno, 1 ex., VII, *leg.* COLONNELLI (COLONNELLI i.l.); (M).
Dichotrachelus bensai Sol.: COLONNELLI, 1974: 161; Colle del Dragone, p.c., VII.
Donus brucki Cap.: Coppola di Paola, vetta, 1 ex., VII;
Donus crinitus Boh.: Campotenese, 1 ex., VI;
Donus salviae Schrnk.: MAGNANO, 1957: 44; COLONNELLI, 1974: 160; Piano Ruggio, 1 ex., VII; Anticristo, 1 ex., VII.
Dorytomus melanophtalmus Payk.: COLONNELLI, 1974: 149;
Dorytomus taeniatus F.: MAGNANO, 1957: 39; Valle di Malevento, 1 ex., VII.
Dryophtorus corticalis Payk.: COLONNELLI, 1974: 147.
Echinodera hypocrita Boh.: MAGNANO, 1957: 45; COLONNELLI, 1974: 166; Acqua Tremola, p.c., VI; Cugno dell'Acero, r., VI-VII; Duglia, c., V-VII; Pantano Grande, r., VI; Piano Pollino, 1 ex., VII; Madonna di Pollino, r., VII; Valle Malvento, c., VI; Piano Ruggio, c., VI; Anticristo, r., VI-VII;
Echinodera variegata Boh.*: Duglia, 1 ex., VI.
Gymnetron anthirrhini Payk.: COLONNELLI, 1974: 172; Serra del Prete, pendici ovest, 1 ex., VII;
Gymnetron asellus Gravh.: MAGNANO, 1957: 49;
Gymnetron bipustulatum Rossi: MAGNANO, 1957: 50; COLONNELLI, 1974: 172; Piano Ruggio, r., VI; Anticristo, 1 ex., VI;
Gymnetron herbarum Bris.: COLONNELLI, 1974: 172;
Gymnetron pascuorum Gyll.: Anticristo, r., VI; Campotenese, r., VI;
Gymnetron rostellum Herbst **: Cugno Ruggeri, r., VI; noto di Piemonte, Lombardia, Trentino A. Adige, Sicilia (LUIGIONI, 1929: 965);
Gymnetron tetrum F.: MAGNANO, 1957: 50; COLONNELLI, 1974: 171;
Gymnetron veronicae Germ.*: Valle Malvento, 1 ex., VI.
Hadroplontus trimaculatus F.: MAGNANO, 1957: 47; Campotenese, 1 ex., VI.
Hylobius abietis L.: MAGNANO, 1957: 43; COLONNELLI, 1974: 156; Duglia, r., VI-VII; Cugno Ruggeri, 1 ex., VI; Valle di Malevento, 1 ex., VII.
Hypera murina F.: Terranova P., p.c., VI;
Hypera nigrirostris F.: Colle dell'Impiso, r., VI; Vallone Zaperna, r., VI; Piano Ruggio, c., VI;
Hypera postica Gyll.: COLONNELLI, 1974: 160; Anticristo, 1 ex., VII; Campotenese, r., VI-VII;
Hypera venusta F.: MAGNANO, 1957: 45 (sub *Phytonomus trilineatus* Marsh.); Anticristo, 1 ex., VI;
Hypera zoilus Scop.: MAGNANO, 1957: 45; COLONNELLI, 1974: 160 (sub *Phy-*

tonomus punctatus F.); Piano Ruggio, r., VII; Colle del Dragone, 1 ex., VI; Valle della Caballa, 1 ex., VI; Vacquarro, 1 ex., VI.

Larinus carinirostris Gyll.: MAGNANO, 1957: 33;

Larinus carlinae Ol.: MAGNANO, 1957: 34;

Larinus jaceae F.: MAGNANO, 1957: 34; COLONNELLI, 1974: 145; Piano Toscano, r., VI; Valle Zaperna, 1 ex., VI;

Larinus obtusus Gyll.: MAGNANO, 1957: 35; Valle Malvento, 1 ex., VI;

Larinus rusticanus Gyll.: MAGNANO, 1957: 34;

Larinus scolymi Ol.: MAGNANO, 1957: 35;

Larinus sturnus Schall.: COLONNELLI, 1974: 144; Valle Zaperna, r., VII; Piano Ruggio, c., VII; Valle della Caballa, r., VII; Anticristo, c., VII-VIII;

Larinus turbinatus Gyll.: MAGNANO, 1957: 34; COLONNELLI, 1974: 145; Duglia, c., VIII; Vacqquarro, 1 ex., VI; Fontana Rummo, 1 ex., VI; Timpa del Demonio, r., VI; Valle Malvento, c., VIII; Piano Ruggio, c., VI; Anticristo, r., VI-VIII;

Larinus vulpes Ol.: MAGNANO, 1957: 33.

Leiosoma oblongulum Boh.: MAGNANO, 1957: 43; COLONNELLI, 1974: 158; Anticristo, r., VII;

Leiosoma scrobiferum ssp. *baudii* Bed.: MAGNANO, 1957: 44; COLONNELLI, 1974: 158; Duglia, 1 ex., VIII, *leg.* DE MARZO.

Limnobaris t-album L.: COLONNELLI, 1974: 166.

Limobius borealis Payk.: COLONNELLI, 1974: 160; Piano Toscano, r., VI.

Liparus coronatus Goeze: COLONNELLI, 1974: 156.

Lixus acicularis Germ.: MAGNANO, 1957: 36;

Lixus algirus L.: MAGNANO, 1957: 36; Piano Ruggio, p.c., VII; Anticristo, r., VII; Campotenese, c., VII;

Lixus ascanii L.: Duglia, 1 ex., VI, *leg.* COLONNELLI (COLONNELLI i.l.);

Lixus cardui Ol.: MAGNANO, 1957: 36; Campotenese, 1 ex., VIII;

Lixus curvirostris Cap.: COLONNELLI, 1974: 145;

Lixus elongatus Germ.: MAGNANO, 1957: 36; Terranova P., r., VI; Anticristo, c., VII;

Lixus iridis Ol.: MAGNANO, 1957: 35;

Lixus lateralis Panz.: MAGNANO, 1957: 35;

Lixus myagri Ol.: Piano Ruggio, 1 ex., VII;

Lixus punctiventris Boh.: Acqua Tremola, 1 ex., VII;

Lixus sanguineus Rossi: MAGNANO, 1957: 36; COLONNELLI, 1974: 146; Terranova P., 1 ex., VII; Campotenese, r., VI-VII.

Magdalis barbicornis Latr.: MAGNANO, 1957: 42 (sub *M. mixta* Desbr.);

Magdalis cerasi L.: Cugno dell'Acero, p.c., VI;

Magdalis exarata Bris.: MAGNANO, 1957: 43;

Magdalis frontalis Gyll.: Piano Ruggio, c., VI; Anticristo, c., VI;
Magdalis memnonia Gyll.*: Piano Ruggio, c., VI; Anticristo, c., VI.
Mecaspis caesus Gyll.: MAGNANO, 1957: 37; Valle di Malevento, r., VII;
Mecaspis emarginatus F.: MAGNANO, 1957: 37; COLONNELLI, 1974: 146.
Mecinus janthinus Germ.*: Coppola di Paola, vetta, 1 ex., VII;
Mecinus pyraster Herbst: Anticristo, r., VII; Campotenese, c., VII.
Metacinops rhinomacer ssp. *calabrus* Stierl.: MAGNANO, 1957: 38; COLONNELLI, 1974: 147.
Mesites curvipes Boh.: Fontana Rummo, r., VI; Vacquarro, c., VI.
Miaromimus distinctus Boh.: MAGNANO, 1957: 50; (M);
Miaromimus fuscopubens Reitt.: MAGNANO, 1957: 50; (M);
Miaromimus graminis Gyll.: COLONNELLI, 1974: 172; (M);
Miaromimus plantarum Germ.: MAGNANO, 1957: 50; Valle Malvento, 1 ex., VI; Piano Ruggio, 1 ex., VI.
Microplontus fairmairei Bris.**: Piano Ruggio, 1 ex., VI; COLONNELLI (i.l.) ha reperito questa specie a Serra delle Ciavole, 1 ex. ♀, VI, deponente su capolino di *Senecio tenorei*, nuova pianta ospite; Alpi Marittime e A. Cozie (LUIGIONI, 1929: 933); COLONNELLI (i.l.) la conosce anche di Abruzzo (Campo Felice) e Marche (M.te Sibilla); (M).
Mogulones cruciger Herbst: COLONNELLI, 1974: 168; Valle Malvento, 1 ex., VI; Piano Ruggio, r., VI-VII;
Mogulones geograficus Goeze: MAGNANO, 1957: 47; COLONNELLI, 1974: 168; Valle Malvento, r., VI; Valle della Caballa, r., VI;
Mogulones lucanus Col.: COLONNELLI, 1974: 169 (sub *C. ornatus* Gyll.); COLONNELLI, 1983: 169;
Mogulones pallidicornis Bris.: COLONNELLI, 1974: 169; (M).
Mogulones t-album Gyll.: MAGNANO, 1957: 47 (sub *C. aubei* Boh.); COLONNELLI, 1974: 169; Valle Malvento, r., VI, *leg.* MONTEMURRO.
Nedyus quadrimaculatus L.: MAGNANO, 1957: 46 (sub *Cidnorrhinus*); COLONNELLI, 1974: 168; Acqua Tremola, r., VI; Piano delle Mandre, r., VI; Pantano Grande, r., VI; Valle Malvento, c., VI; Piano Ruggio, c., VI.
Neoplinthus tigratus Rossi: MAGNANO, 1957: 44; COLONNELLI, 1974: 159 (sub *N. tigratus* ssp. *abbreviatus* Sol., COLONNELLI i.l.); Piano Ruggio, 1 ex., VII, *leg.* MONTEMURRO; (M).
Otiorhynchus alpicola ssp. *strigirostris* Boh.: MAGNANO, 1957: 20; COLONNELLI, 1974: 131; (M);
Otiorhynchus alutaceus Germ.: MAGNANO, 1957: 19; COLONNELLI, 1974: 130; Terranova P., 1 ex., VI; Piano Ruggio, c., VI; Coppola di Paola, pendici sud, r., VII;

Otiorhynchus anthracinus Steph.: MAGNANO, 1957: 21; COLONNELLI, 1974: 133; Piano Ruggio, 1 ex., VII;

Otiorhynchus armatus Boh.: MAGNANO, 1957: 20; COLONNELLI, 1974: 131; Campotenese, 1 ex., VII;

Otiorhynchus brevipes ssp. *tarentinus* Sol.: MAGNANO, 1957: 16;

Otiorhynchus brutius Reitt.: MAGNANO, 1957: 18 (sub *O. perdix* Ol.); Timpa del Demonio, c., VI; Anticristo, r., VI; Campotenese, c., VII;

Otiorhynchus calabrolucanus Lona: MAGNANO, 1957: 22; COLONNELLI, 1974: 134; (E);

Otiorhynchus cardiniger ssp. *minutesquamosus* Sol.: MAGNANO, 1957: 18;

Otiorhynchus colonnellii Magn.: COLONNELLI, 1974: 132 (sub *O. cribrirostris* Leoni n. ssp.); (E);

Otiorhynchus consentaneus ssp. *dimorphus* Sol.: MAGNANO, 1957: 17; COLONNELLI, 1974: 130;

Otiorhynchus corruptor Host.*: Piano Ruggio, 1 ex., VII; Coppola di Paola, vetta, p.c., VII;

Otiorhynchus crinipes ssp. *pilipes* Leoni *: Campotenese, 1 ex., VII; (M);

Otiorhynchus cribricollis Gyll.: MAGNANO, 1957: 21; Campotenese, r., VI-VII;

Otiorhynchus desertus Rosh. ssp.?: COLONNELLI, 1974; 132; (M).

Otiorhynchus indefinitus Reitt.: MAGNANO, 1957: 22; COLONNELLI, 1974: 134; (M);

Otiorhynchus ligneoides Stierl.: MAGNANO, 1957: 19;

Otiorhynchus lugens Germ.: Vacquarro, c., VI; Valle Malvento, p.c., VI;

Otiorhynchus mastix ssp. *perlongus* Sol.: MAGNANO, 1957: 15; COLONNELLI, 1974: 128; Vacquarro, 1 ex., VI;

Otiorhynchus porcellus Dan.: MAGNANO, 1957: 24; COLONNELLI, 1974: 133; (M);

Otiorhynchus rugosostriatus Goeze: MAGNANO, 1957: 20;

Otiorhynchus setosulus Stierl.: MAGNANO, 1957: 22; COLONNELLI, 1974: 133; Colle del Dragone, 1 ex., VII.

Pachycerus scabrosus Brullé: MAGNANO, 1957: 37.

Pachytychius discithorax Desbr.: COLONNELLI, 1974: 149 (sub *P.* n. sp.); CALDARA, 1978: 192.

Parascythropus baudii Stierl.: COLONNELLI, 1974: 138.

Pelenomus quadrituberculatus F.: MAGNANO, 1957: 49 (sub *Phytobius*); (M).

Phloeophagus lignarius Marsh.: OSELLA, 1975: 421; Duglia, r., V-VIII.

Phyllobius argentatus L.: MAGNANO, 1957: 27; COLONNELLI, 1974: 138; Acqua Tremola, c., VI; Pantano Grande, p.c., VI; Piano Ruggio, p.c., VI; Anticristo, r., VI;

Phyllobius longipilis Boh.: MAGNANO, 1957: 28; COLONNELLI, 1974: 137; Piano Ruggio, 1 ex., VI;

Phyllobius maculicornis ssp. *lucanus* Sol.: MAGNANO, 1957: 27; COLONNELLI, 1974: 137; Piano Ruggio, r., VI;

Phyllobius oblongus L.: MAGNANO, 1957: 26; COLONNELLI, 1974: 137; Cugno Ruggeri, r., VI; Duglia, p.c., VI-VII; Valle Malvento, r., VI;

Phyllobius pyri ssp. *italicus* Sol.: MAGNANO, 1957: 26; COLONNELLI, 1974: 137; Valle Zaperna, r., VI; Valle Malvento, 1 ex., VI; Piano Ruggio, c., VI; Campotenese, 1 ex., VII;

Phyllobius romanus Faust.: MAGNANO, 1957: 27; COLONNELLI, 1974: 137; Piano Toscano, r., VI; Vacquarro, c., VI-VII; Colle Gaudolino, r., VI; Valle Malvento, 1 ex., VI; Piano Ruggio, 1 ex., VI; Anticristo, r., VI;

Phyllobius raverai Sol.: COLONNELLI, 1974: 138;

Phyllobius subdentatus Boh.: MAGNANO, 1957: 26; COLONNELLI, 1974: 136; Vacquarro, r., VI; Valle Malvento, c., VI; Piano Ruggio, c., VI; Anticristo, p.c., VI.

Pissodes castaneus Deg.: Piano Ruggio, c., VI; Anticristo, r., VI;

Pissodes piceae Ill.: COLONNELLI, 1974: 156; Duglia, 1 ex., VII; Serra del Prete, pendici nord-est, 1 ex., VII;

Pissodes validirostris Gyll.**: Cugno Ruggeri, 1 ex., VI; noto di Trentino A. Adige e Friuli V. Giulia (LUIGIONI, 1929: 919).

Plinthus illigeri ssp. *colonnellii* Mereg.: COLONNELLI, 1974: 159 (sub *Plinthus* n. sp.); MEREGALLI, 1985: 118; (E);

Plinthus megerlei Panz.: COLONNELLI, 1974: 159; MEREGALLI, 1985: 117; (M);

Plinthus squalidus ssp. *granulipennis* Fairm.: MAGNANO, 1957: 44; 1960: 289; COLONNELLI, 1974: 159; MEREGALLI, 1985: 115; (M).

Polydrusus brevicollis Desbr.: MAGNANO, 1957: 29; COLONNELLI, 1974: 140; Campotenese, 1 ex., VII;

Polydrusus cervinus L.: MAGNANO, 1957: 29; COLONNELLI, 1974: 140; Valle Malvento, c., VI; Anticristo, 1 ex., VII;

Polydrusus frater Rottbg.: MAGNANO, 1957: 30;

Polydrusus kahri Kirsh.: Terranova P., 1 ex., VI;

Polydrusus impar Gozis: MAGNANO, 1957: 28; COLONNELLI, 1974: 138; Vacquarro, r., VI; Colle dell'Impiso, 1 ex., VI; Valle Malvento, c., VI;

Polydrusus modestus Stierl.: MAGNANO, 1957: 20; Colle Gaudolino, 1 ex., VII;

Polydrusus pilosus Gredl.: MAGNANO, 1957: 29; COLONNELLI, 1974: 140; Vacquarro, 1 ex., VI; Valle Zaperna, 1 ex., VI; Piano Ruggio, c., VI-VII;

Polydrusus pirazzolii Stierl.: COLONNELLI, 1974: 139; Duglia, r., VI, *leg.* MONTEMURRO;

Polydrusus pterygomalis Boh.: COLONNELLI, 1974: 140; Piano Ruggio, 1 ex., VI; (M);

Polydrusus raverai Sol.: MAGNANO, 1957: 30; COLONNELLI, 1974: 141; Acqua Tremola, r., VI; Piano delle Manlre, 1 ex., VI; Valle Zaperna, 1 ex., VI; Valle Malvento, c., VI; Piano Ruggio, p.c., VI; Anticristo, r., VI;

Polydrusus scutellaris Chevr.: MAGNANO, 1957: 28; COLONNELLI, 1974: 139; Piano Pollino, r., VII; Piano Ruggio, c., VI;

Polydrusus siculus Desbr.: MAGNANO, 1957: 29; COLONNELLI, 1974: 139;

Polydrusus sparsus Gyll.: COLONNELLI, 1974: 140; Duglia, 1 ex., VII; Valle di Malevento, 1 ex., VII;

Polydrusus subnotatus Schils.: MAGNANO, 1957: 28; COLONNELLI, 1974: 139; Valle Malvento, c., VI.

Pseudocleonus italicus Sol.: MAGNANO, 1957: 37; COLONNELLI, 1974; 146; (M).

Pseudocoeliodes rubricus Gyll.: COLONNELLI, 1974: 167.

Pseudomyllocerus neapolitanus Pic: MAGNANO, 1957: 25 (sub *P. sinuatus* F.); COLONNELLI, 1974: 136 (sub *Phyllobius paganettii* Schils., COLONNELLI i.l.); Duglia, r., VIII, *leg.* DE MARZO; Campotenese, 1 ex., VII.

Pseudomeira binaghii Sol.: MAGNANO, 1957: 25;

Pseudomeira obscura Sol.: COLONNELLI, 1974: 134; Coppola di Paola, pendici nord-est, 1 ex., VII;

Pseudomeira sp. prope *vitalei* Desbr.: COLONNELLI, 1974: 134.

Pseudorhinus impressicollis Boh. ssp. (prope *peninsularis* Sol.): COLONNELLI, 1974: 161.

Rhamphus oxyacanthae Marsh.: COLONNELLI, 1974: 174; (sub *R. pulicarius Herbst*, COLONNELLI i.l.); Duglia, 1 ex., VIII; Campotenese, r., VII.

Rhinocyllus conicus F.: MAGNANO, 1957: 30; Piano Ruggio, 1 ex., VII.

Rhinoncus pericarpius L.: MAGNANO, 1957: 49; COLONNELLI, 1974: 167; Piano Ruggio, 1 ex., VII.

Rhynchaenus decoratus Germ.*: Serra del Prete, pendici nord-est, 1 ex., VI; Vacquarro, 1 ex., VI; (M);

Rhynchaenus fagi L.: MAGNANO, 1957: 52; COLONNELLI, 1974: 174; Valle Zaperna, 1 ex., VI; Valle Malvento, 1 ex., VIII; Piano Ruggio, 1 ex., VI; Fosso Mauro, 1 ex., VI;

Rhynchaenus pilosus F.: MAGNANO, 1957: 52;

Rhynchaenus stigma Germ.: COLONNELLI, 1974: 174; (M).

Rhyncholus chloropus L.: MAGNANO, 1957: 38 (sub *R. ater* L.); (M);

Rhyncholus elongatus Gyll.: MAGNANO, 1957: 38; COLONNELLI, 1974: 148;

Rhyncholus lignarius Marsh.*: Vacquarro, 1 ex., VI, *leg.* MONTEMURRO;

Rhyncholus punctatulus Boh.*: Duglia, 1 ex., VI, sotto corteccia di *Abies alba* L., *leg.* COLONNELLI (COLONNELLI i.l.).

Rutidosoma fallax Otto **: Piano Ruggio, 1 ex., VI; nota di Trentino A. Adige (LUIGIONI, 1929: 927); (M).

Sibinia attalica Gyll.: MAGNANO, 1957: 41; COLONNELLI, 1974: 154; Colle Gaudolino, 1 ex., VI;

Sibinia femoralis Germ.: CALDARA, 1983-84: 45;

Sibinia pellucens Scop.: CALDARA, 1983-84: 39; Piano Ruggio, 1 ex., VI; Anticristo, r., VI-VII.

Sitona callosus Gyll.: COLONNELLI, 1974: 143;

Sitona cambricus Steph.: MAGNANO, 1957: 31 (sub *Sitona* n. sp.); 1959: 160 (sub *S. solarii* n. sp.) (vedasi COLONNELLI, 1974: 142);

Sitona cinerascens Fahrs.: COLONNELLI, 1974: 142;

Sitona crinitus Herbst: MAGNANO, 1957: 31;

Sitona discoideus Gyll.: MAGNANO, 1957: 32; Anticristo, r., VI; Campotenese, c., VI-VII; (M);

Sitona intermedius Küst.: Campotenese, c., VII;

Sitona hirsutus Desbr.**: Cugno Ruggeri, r., VI; Cugno dell'Acero, r., VI; noto di Abruzzo, Sicilia, Sardegna e Corsica (LUIGIONI, 1929: 891);

Sitona hispidulus F.: COLONNELLI, 1974: 144; Piano Ruggio, 1 ex., VI, *leg.* MONTEMURRO;

Sitona humeralis Steph.: MAGNANO, 1957: 32; Campotenese, 1 ex., VI;

Sitona limosus Rossi: Campotenese, 1 ex., VI, *leg.* COLONNELLI (COLONNELLI i.l.);

Sitona lineatus L.: COLONNELLI, 1974: 142;

Sitona lividipes Fahrs.: Duglia, 1 ex., VIII, *leg.* DE MARZO;

Sitona puncticollis Steph.: COLONNELLI, 1974: 143; Campotenese, r., VII;

Sitona sulcifrons ssp. *angustifrons* Reitt.: MAGNANO, 1957: 31; COLONNELLI, 1974: 143; Duglia, 1 ex., VIII, *leg.* DE MARZO; Piano Pollino, 1 ex., VII; Fontana Rummo, 1 ex., VI; Vacquarro, c., VI; Valle Malvento, 1 ex., VI; Piano Ruggio, c., VI; Piano Ruggio, c., VI-VII;

Sitona suturalis Steph.: COLONNELLI, 1974: 143.

Smicronyx brevicornis Sol.: MAGNANO, 1974: 143.

Smicronyx coecus Reich: COLONNELLI, 1974: 152; (M).

Smicronyx nebulosus Tourn.: COLONNELLI, 1974: 151; Piano Ruggio, 1 ex., VI; Valle della Caballa, 1 ex., VI;

Smicronyx reichi Gyll.: COLONNELLI, 1974: 150; (M).

Stenocarus fuliginosus Marsh.: COLONNELLI, 1974: 168.

Stereocorynes truncorum Germ.: MAGNANO, 1957: 39.

Strophosoma melanogrammus Först.: Valle Malvento, 1 ex., VII; Cozzo di Dimoniello, 1 ex., VI.

Tanysphyrus lemnae Payk.: COLONNELLI, 1974: 149.
Trachyphloeus alternans Gyll.: MAGNANO, 1957: 25; COLONNELLI, 1974: 135; (M);
Trachyphloeus laticollis Boh.: COLONNELLI, 1974: 135;
Trachyphloeus spinimanus Germ.*: Valle Malvento, 1 ex., VI; (M).
Trichosirocalus horridus Panz.: MAGNANO, 1957: 46 (sug *Ceuthorrhynchidius horridus* Panz.); Piano Ruggio, 1 ex., VI;
Trichosirocalus rufulus Duf.: MAGNANO, 1957: 46; COLONNELLI, 1974: 168 (sub *Ceuthorrhynchidius rufulus* Duf.); Valle della Caballa, 1 ex., VI;
Trichosirocalus urens Gyll.: MAGNANO, 1957: 46; COLONNELLI, 1974: 167 (sub *Ceuthorrhynchidius urens* Gyll.);
Trichosirocalus troglodytes F.: MAGNANO, 1957: 46 (sub *Ceuthorrhynchidius troglodytes* F.); Piano Ruggio, 1 ex., VI.
Tropiphorus obtusus Boisd.: MAGNANO, 1957: 32; COLONNELLI, 1974: 144; Valle Zaperna, 1 ex., VI; (M);
Tropiphorus sp. prope *terricola* Newm.: Piano Ruggio, r., VI.
Tychius armatus Tourn.: COLONNELLI, 1974: 153;
Tychius caldarai Dieckm.: Terranova P., 1 ex., VII, *leg.* SCHATZMAYR & KOCH, *coll.* Mus. Milano (CALDARA i.l.);
Tychius cuprifer Panz.: COLONNELLI, 1974: 154 (sub *Miccotrogus cuprifer* Panz.); Valle Malvento, 1 ex., VI; Campotenese, 1 ex., VII;
Tychius curtirostris Desbr.: Terranova P., r., VI; Campotenese, 1 ex., VII;
Tychius flavicollis Steph.: MAGNANO, 1957: 40; Piano Ruggio, r., VI;
Tychius focarilei Sol.: COLONNELLI, 1974: 152; (M);
Tychius kulzeri Pen.: M. Pollino, m 1800, 1 ex., VII, *leg.* SCHATZMAYR & KOCH, *coll.* Mus. Milano (CALDARA i.l.);
Tychius picirostris F.: MAGNANO, 1957: 41; COLONNELLI, 1974: 154 (sub *Miccotrogus picirostris* F.); Piano Ruggio, 1 ex., VI; Anticristo, r., VI;
Tychius pusillus Germ.: MAGNANO, 1957: 41 (sub *T. neapolitanus* Tourn.: COLONNELLI, 1974: 153, nota);
Tychius quinquepunctatus L.: MAGNANO, 1957: 37 (sub *Aoromius quinquepunctatus* L.); Campotenese, 1 ex., VI;
Tychius schneideri Herbst: MAGNANO, 1957: 40 (sub *T. polylineatus* Germ.); COLONNELLI, 1974: 152; Piano Ruggio, c., VI;
Tychius stephensi Schönh.: Piano Ruggio, 1 ex., VI;
Tychius thoracicus Boh.: MAGNANO, 1957: 40;
Tychius tibialis Boh.: MAGNANO, 1957: 41; COLONNELLI, 1974: 153; Piano Ruggio, 1 ex., VI; Campotenese, 1 ex., VII;
Tychius tomentosus Herbst: MAGNANO, 1957: 40 (sub *T. lineatulus* Steph.); COLONNELLI, 1974: 153.

Zacladus affinis Payk.: Valle Malvento, 1 ex., VI;
Zacladus exiguus Ol.: Coppola di Paola, pendici sud, 1 ex., VI.

CONSIDERAZIONI

Ho già esposto in altra sede (« Coleotterofauna del bosco di Policoro ») i motivi per cui ritengo prematuro presentare considerazioni di carattere zoogeografico e, per le stesse ragioni, qui mi limito a segnalare i reperti più significativi emersi nel corso dello studio sulla coleotterofauna del Massiccio del Pollino:

a) specie da considerare tuttora presumibilmente endemiche: *Trechus angelae* Magr., *T. schatzmayr* Foc., *Anemadus strigosus* ssp. *pollinensis* Tam., *Bathysciola ruffoi* Tam., *Atheta pollinensis* Scheerp., *Leptusa kochiana* Bernh., *L. pollinensis* Pace, *Mycetoporus pollinensis* Scheerp., *Ocalea pollinensis* Scheerp., *Sipalia focarilei* Scheerp., *S. tamaninii* Scheerp., *Opilio taeniatus torretassoi* Wittm., *Cyphon palmi* Nyholm, *Rhamnusium graecum* ssp. *italicum* Müll., *Acalles saccoi* Colonn., *Otiorhynchus calabrolucanus* Lona, *O. colonnellii* Magn., *Plinthus illigerii* ssp. *colonnellii* Mereg.;

b) specie nuove per la fauna italiana: *Acrotrichis sitkaensis* Motsch., *Acrolocha amabilis* Heer, *Micropeplus latus* Hampe, *Stenus binaghii* Putz, *Malthinus striatulus* Marsh., *Ebaeus ater* Kiesw., *Ceutorhynchus angustus* Dieckm. & Smrezc., *Pachytychius discitorax* Desbr.;

c) specie sinora note di singole regioni italiane: *Leiodes longipes* Schmidt, *Euthicomus conicicollis* Fairm., *Ptiliolum marginatum* Aubé, *Gyrohypnus angustatus* Steph., *Ampedus melanurus* Muls., *Selatosomus impressus* F., *Lathridius anthracinus* Mannh., *Cis dentatus* Mellié, *Stephanopachys quadricollis* Mars., *Ernobius nigrinus* Sturm, *Ochina latreillei* Bon., *Phytobaeus amabilis* Sahlb., *Mordella holomelaena* Apflb., *Mordellistena micantoides* Erm., *Isomira icteropa* Küst., *Polygraphus grandiclava* Thoms., *Microplontus fairmairei* Bris., *Pissodes validirostris* Gyll., *Rutidosoma fallax* Otto;

d) specie sinora note delle Isole: *Biploporus ultimus* Guill., *Bruchidius pygmaeus* Boh., *Apion alcioneum* Germ.;

e) 182 specie aventi in Italia una distribuzione di tipo alpino e/o appenninico, hanno il loro limite meridionale di diffusione sul Massiccio del Pollino.

La tabella che segue elenca le famiglie di Coleotteri attualmente note per il Pollino con l'indicazione del rispettivo numero di specie reperitevi; di ogni famiglia è altresì riportato il rapporto percentuale fra il numero delle specie reperite sul Pollino e il numero complessivo delle specie note d'Italia.

Famiglia	SPECIE POLLINO			% su totale specie famiglia
	già note	nuove	totale	
Carabidae	114	42	156	11,5
Haliplidae	1	1	2	9,5
Hygrobiidae		1	1	100
Dytiscidae	29	6	35	19
Gyrinidae	2		2	15
Hydrophilidae	9	31	40	18,5
Histeridae	22	14	36	22
Silphidae	5	2	7	23,5
Leptinidae		1	1	50
Catopidae	4	7	11	7,5
Colonidae	1		1	4
Leiodidae	3	18	21	23
Clambidae		2	2	18
Scydmaenidae	2	7	9	5,5
Corylophidae		2	2	6,5
Ptiliidae		7	7	11,5
Scaphidiidae	4	2	6	33
Staphylinidae	103	91	194	11
Pselaphidae	4	13	17	6
Lycidae	3	1	4	27
Lampyridae	3		3	15
Cantharidae	18	10	38	19
Drylidae		1	1	33
Melyridae	33	11	44	18
Cleridae	6	4	10	33
Lymexylonidae		1	1	50
Cebrionidae		2	2	22
Elateridae	41	17	58	26
Eucnemidae	3	1	4	23 5
Throscidae	1	1	2	20
Buprestidae	44	4	48	24
Dascillidae	1		1	20
Helodidae	4		4	13
Eucinetidae		1	1	33
Dryopidae		2	2	12
Elmididae		3	3	11
Heteroceridae		2	2	8
Dermestidae		18	18	24
Byrrhidae	2		2	5
Trogositidae	3	3	6	60
Byturidae	1	1	2	40
Nitidulidae	10	26	36	21
Rhizophagidae	3		3	19
Cucujidae		11	11	11
Erotylidae	2	5	7	35

Famiglia	SPECIE POLLINO			% su totale specie famiglia
	già note	nuove	totale	
Cryptophagidae	10		10	9,5
Phalacridae	1	1	2	6
Merophysiidae		1	1	7
Lathridiidae		18	18	25
Dasyceridae		1	1	100
Mycetophagidae		5	5	25
Colydiidae	3	9	12	19
Cerylonidae		5	5	62,5
Endomychidae	1	4	5	16,5
Coccinellidae	2	33	35	27
Sphindidae		1	1	100
Aspidiphoridae		1	1	50
Cisidae		15	15	35,5
Lyctidae		1	1	20
Bostrychidae		5	5	25
Anobiidae		18	18	17
Ptinidae		8	8	17
Oedemeridae	11	6	17	38
Pythidae	1	3	4	19
Pyrochroidae		2	2	50
Scraptiidae		2	2	25
Aderidae		1	1	5,5
Anthicidae	2	13	15	16
Meloidae	8	1	9	13,5
Mordellidae	20	11	31	37
Melandryidae	2	3	5	12,5
Lagriidae		2	2	50
Alleculidae	9	7	16	28,5
Tenebrionidae	18	15	33	12,5
Scarabaeidae	78	15	93	28
Lucanidae	5		5	62,5
Cerambycidae	66	12	78	27,5
Chrysomelidae	49	63	112	15
Bruchidae	1	16	17	21
Anthribidae	3	2	5	15
Scolytidae	9	11	20	13
Nemonychidae		1	1	33,3
Attelabidae	2		2	66
Rhynchitidae	14	1	15	43
Apionidae	63	14	77	41,5
Curculionidae	210	50	260	16
TOTALE	1.079	745	1.824	16,5

RIASSUNTO

Si riportano i dati di cattura relativi a 745 specie di Coleotteri non ancora segnalate per il Massiccio del Pollino, tra cui 251 specie nuove per la Basilicata o Calabria e 22 specie sinora note solo di singole regioni italiane o isole. Di queste ultime viene riportata la diffusione in Italia. Inoltre, i nuovi reperti comprendono 4 specie nuove per la fauna italiana, *Acrotrichis sitkaensis* Motsch., *Acrolocha amabilis* Heer, *Micropeplus latus* Hampe, *Ceutorhynchus angustus* Dieckm., e 1 specie descritta di recente come nuova per la scienza *Agathidium montemurroi* Ang. & Dmz.

Tenendo conto anche dei dati già pubblicati da Autori vari, si rileva che 182 specie raggiungono sul Pollino il loro limite meridionale di diffusione, mentre 18 specie risultano endemiche di tale complesso montuoso. In totale la coleotterofauna del Pollino conta finora 1.824 specie.

Le stazioni esplorate dall'autore sono indicate in una cartina. In un'apposita tabella viene riportato il numero di specie note per ciascuna famiglia.

SUMMARY

Coleoptera OF THE POLLINO MASSIF (BASILICATA-CALABRIA)

Field data are presented on 745 species of Coleoptera, not recorded so far from Pollino Massif (Southern Italy). They include: *a*) 251 new records from Basilicata or Calabria, *b*) 22 species which were known so far only from single regions or islands of Italy, *c*) 1 recent new description, *Agathidium montemurroi* Ang. & Dmz., *d*) 4 new records from the whole Italy, *Acrotrichis sitkaensis* Motsch., *Acrolocha amabilis* Heer, *Micropeplus latus* Hampe, *Ceutorhynchus angustus* Dieckm., *e*) 182 species which exhibit their southern distribution limit on Pollino, *f*) 18 endemic species.

Owing to these new data, the coleopterous fauna of Pollino includes so far as many as 1824 species of 86 families.

BIBLIOGRAFIA *

ALIQUÒ V. & MASSA B., 1976 - Contributo allo studio di *Anoxia scutellaris* s.l. e descrizione di *Anoxia scutellaris argentea* n. ssp. di Sicilia. *Boll. Soc. ent. ital.*, 108: 151-157.

ANGELINI F., 1978 - *Haliplidae*, *Dytiscidae* e *Gyrinidae* della Lucania. *Entomologica*, Bari, 14: 63-135.

ANGELINI F., 1982 - Catalogo topografico dei *Coleoptera Haliplidae*, *Hygrobiidae*, *Dytiscidae* e *Gyrinidae* d'Italia. *Mem. Soc. ent. ital.*, 61/A: 45-126.

ANGELINI F. & MONTEMURRO F., 1986 - Coleotterofauna del bosco di Policoro (Matera). (*Coleoptera*). *Lav. Soc. ital. Biogeogr.*, (n. s.) (in stampa).

AUDISIO P., 1975 - Note su alcune specie italiane del genere *Meligetes* Steph. *Boll. Ass. Romana Entomol.*, 30: 2-16.

AUDISIO P., 1976 - Note su alcune *Epuraea* italiane. *Boll. Soc. ent. ital.*, 108: 95-96.

BAUDI DI SELVE F., PICCIOLI F. & CAVANNA G., 1882 - Al Vulture ed al Pollino. Parte II Catalogo degli animali raccolti al Vulture, al Pollino ed in altri luoghi dell'Italia meridionale e centrale. *Boll. Soc. ent. ital.*, 14: 63-81.

BERTRAND H., 1956 - Ricerche Zoologiche sul Massiccio del Pollino. XX. *Coleoptera* - 10. Coléoptères acquatiques de Calabre. *Ann. Ist. Mus. Zool. Univ. Napoli*, VIII (4): 1-8.

---

* Sono elencati solo i lavori che contengono dati sul Massiccio del Pollino e che sono citati nel testo; sono pertanto esclusi tutti quei lavori, anche « Faune » e « Cataloghi » da cui è stata desunta solo la diffusione generale delle specie.

BINAGHI G., 1955 - Ricerche Zoologiche sul Massiccio del Pollino. XII. *Coleoptera* - 2. *Elateridae, Melasidae, Throscidae* e *Dascillidae*. *Ann. Ist. Mus. Zool. Univ. Napoli*, VII (9): 1-19.

BINAGHI G., DELLACASA G. & POGGI R., 1969 - Nuovi caratteri diagnostici per la determinazione degli *Onthophagus* del gruppo *ovatus* (L.) e geonemia controllata delle specie italiane del gruppo. *Mem. Soc. ent. ital.*, 48, fasc. 1 B: 29-46.

BOLOGNA M. A., 1976 - Reperti di *Oedemeridae* dell'Italia centromeridionale e insulare. *Boll. Ass. Romana Entomol.*, 31: 29-31.

BORDONI A. & CASTELLINI G., 1973 - Sulle specie paleartiche del genere *Mastigus* Latreille con osservazioni su due specie dell'Africa Australe. *Redia*, 54: 295-323.

BRUNO S., 1970 - A proposito di *Carabus* (*Oreocarabus*) *hortensis* L. nelle regioni più meridionali del suo areale. *Boll. Ass. Romana Entomol.*, 25: 46-54.

BUCCIARELLI I., 1961 - Ricerche coleotterologiche sul litorale ionico della Puglia, Lucania e Calabria, Campagne 1956-1957-1958. VIII. *Coleoptera Anthicidae*. *Boll. Soc. ent. ital.*, 91: 102-131.

BUCCIARELLI I., 1980 - *Coleoptera. Anthicidae*. Fauna d'Italia, XVII. Ed. Calderini, Bologna, 240 pp.

BURLINI L., 1955 - Ricerche Zoologiche sul Massiccio del Pollino. XIX. *Coleoptera* - 9. Due nuovi *Pachybrachys* italiani (*Chrysomelidae*). *Ann. Ist. Mus. Zool. Univ. Napoli*, VIII (3): 1-7.

BURLINI M., 1968 - Revisione dei *Cryptocephalus* italiani e della maggior parte delle specie di Europa. *Mem. Soc. ent. ital.*, 34: 5-287.

CALDARA R., 1978 - Revisione dei *Pachytychius* paleartici. *Mem. Soc. ent. ital.*, 56: 131-216.

CALDARA R., 1983 - Revisione delle *Sibinia* paleartiche. *Mem. Soc. ent. ital.*, 62/63: 24-105.

CANZONERI S., 1977 - Contributo alla conoscenza dei Tenebrionidi appenninici. *Boll. Mus. Civ. st. Nat. Verona*, 4: 227-285.

CARPANETO G. M., 1974 a - Endemismi italiani. 15. *Aphodius* (*Acrossus*) *siculus* Harold. *Boll. Ass. Romana Entomol.*, 29: VI.

CARPANETO G. M., 1974 b - Note sulla distribuzione geografica ed ecologica dei Coleotteri Scarabaeoidea Laparosticti nell'Italia appenninica. *Boll. Ass. Romana Entomol.*, 29: 32-54.

CHIESA A., 1959 - *Hydrophilidae Europae* (*Coleoptera Palpicornia*). Arnaldo Forni Editore, Bologna, 199 pp.

COLONNELLI G., 1974 - Gli Attelabidi ed i Curculionidi del Massiccio del Pollino (*Coleoptera*). *Fragm. Entomol.*, X, 2: 107-218.

COLONNELLI G., 1980 - Revisione del Genere *Acallocrates* Reitter. *Atti Soc. ital. Sci. nat. Museo civ. Stor. nat. Milano*, 121 (1-2): 3-16.

ENDRÖDY-YOUNGA, S. - Monographie der paläarktischen Arten der Gattung *Clambus* (*Coleoptera. Clambidae*). *Acta zool. hung.*, Budapest, 6: 257-303.

FIORI G., 1948 - I *Byrrhus* L. s. str. italiani. *Boll. Ist. Ent. Univ. Bologna*, 17: 1-21.

FIORI G., 1951 - Alcuni appunti sui *Byrrhus* L. s. str. Europei. II contributo alla conoscenza della famiglia *Byrrhidae*. *Boll. Ist. Ent. Univ. Bologna*, 18: 293-304.

FOCARILE A., 1949 - I Contributo alla conoscenza dei Trechini paleartici (*Coleoptera: Carabidae*). *Boll. Soc. ent. ital.*, 79: 71-79.

FOCARILE A., 1960 a - Ricerche coleotterologiche sul litorale ionico della Puglia, Lucania e Calabria, Campagne 1956-1957-1958. III. *Coleoptera Haliplidae, Dytiscidae, Gyrinidae*. *Mem. Soc. ent. ital.*, 39: 41-114.

FOCARILE A., 1960 b - Ricerche coleotterologiche sul litorale ionico della Puglia, Lucania e Calabria, Campagne 1956-1957-1958. V. *Coleoptera Helodidae*. *Boll. Soc. ent. ital.*, 90: 112-113.

FOCARILE A., 1961 - Revisione dei coleotteri *Helodidae* conservati nel Museo Civico di Storia Naturale di Milano. 1° - Genere *Cyphon* Payk. *Atti Soc. It. Sc. nat. e Mus. Civ. St. nat. Milano*, 100: 257-268.

FOCARILE A., 1975 - Alcuni interessanti coleotteri della Valle d'Aosta. *Rev. Valdôt. d'Hist. Natur. (Aosta)*, 29: 8-52.

FOCARILE A., 1978 - Interessanti coleotteri della Valle d'Aosta (2ª serie). *Rev. Valdôt. d'Hist. Natur. (Aosta)*, 32: 27-66.

FOGATO W., 1978 - Note sui *Luperus* bicolori italiani e descrizione di *L. leonardii* n. sp. *Mem. Soc. ent. ital.*, 57: 46-64.

FRANCISCOLO M. E., 1956 - Ricerche Zoologiche sul Massiccio del Pollino. XVIII. *Coleoptera* - 8. *Mordellidae, Scraptiidae. Ann. Ist. Mus. Zool. Univ. Napoli*, VIII (1): 1-7.

GARDINI G., 1974 - Materiali per lo studio dei Tenebrionidi dell'Arcipelago Toscano. *Lav. Soc. ital. Biogeogr. (n. s.)*, 5: 637-723.

GENTILI E. & CHIESA A., 1975 - Revisione dei *Laccobius* Paleartici. (*Col. Hydrophilidae*). *Mem. Soc. ent. ital.*, 54: 5-187.

GERINI F., 1952 - Note sui Buprestidi italiani. 1. *Boll. Soc. ent. ital.*, 82: 85-92.

GERINI F., 1955 - Ricerche Zoologiche sul Massiccio del Pollino. XV. *Coleoptera* - 5. *Buprestidae. Ann. Ist. Mus. Zool. Univ. Napoli*, VII (12): 1-7.

GOBBI G., 1971 - I Buprestidi dell'Appennino Lucano. *Boll. Ass. Romana Entoml.*, 26: 33-65.

GOBBI G., 1973 - Interessanti reperti coleotterologici sull'Appennino Lucano. I. *Boll. Ass. Romana Entomol.*, 28: 33-41.

GOBBI G., 1981 - Interessanti reperti di Buprestidi italiani e diagnosi di *Anthaxia liae* n. sp. *Boll. Ass. Romana Entomol.*, 36: 33-41.

GOBBI G., 1983 - Appunti su Coleotteri Cleroidei predatori di xilofagi. *Boll. Ass. Romana Entomol.*, 38: 51-62.

GRIDELLI E., 1956 a - Ricerche Zoologiche sul Massiccio del Pollino. XXI. *Coleoptera* - 11. *Staphylinidae. Ann. Ist. Mus. Zool. Univ. Napoli*, VIII (5): 1-29.

GRIDELLI E., 1956 b - Ricerche Zoologiche sul Massiccio del Pollino. XXIII. *Coleoptera* 13. *Tenebrionidae. Ann. Ist. Mus. Zool. Univ. Napoli*, VIII (9): 1-6.

KOCH C., 1933 - Risultati scientifici delle caccie entomologiche di S.A.S. il Principe ALESSANDRO DELLA TORRE e TASSO in Italia, I. *Anthophagus. Boll. Soc. ent. ital.*, 65: 27-30.

KOCH C., 1937 - Appunti sugli *Staphilinidi* italiani. III. *Boll. Soc. ent. ital.*, 69: 83-88.

KOCH C., 1938 - Appunti sugli *Staphilinidi* italiani. IV. *Boll. Soc. ent. ital.*, 70: 135-141.

LEONARDI C., 1971 - Considerazioni sulle *Psylliodes* del gruppo *napi* e descrizione di una nuova specie. *Atti Soc. It. Sc. nat. e Museo Civ. St. nat. Milano*, 112 (4): 485-533.

LEONARDI C., 1972 - La « *Psylliodes wachsmanni* » Csiki specie distinta e suo inquadramento nel gruppo della « *Psylliodes picina* ». *Atti Mus. Civ. Stor. nat. Trieste*, 28 (1): 137-146.

LEONARDI C., 1975 - Le *Psylliodes* appenniniche del Museo Civico di Storia Naturale di Verona. *Boll. Mus. Civ. St. nat. Verona*, 2: 51-90.

LIBERTI G., 1978 - Revisione delle specie italiane del genere *Danacaea*, primo gruppo. *Mem. Soc. ent. ital.*, 57: 29-45.

LÖBL I., 1970 - Revision der paläarktischen Arten der Gattungen *Scaphisoma* Leach und *Caryoscapha* Ganglbauer der Tribus *Scaphisomini* (*Col. Scaphidiidae*). *Revue suisse Zol.*, 77: 727-799.

MAGISTRETTI M., 1953 - Le specie italiane del genere *Mylabris* F. *Ann. Mus. Civ. st. nat Genova*, 62: 30-54.

MAGISTRETTI M., 1955 a - Ricerche Zoologiche sul Massiccio del Pollino. XI. *Coleoptera* 1. *Carabidae. Ann. Ist. Mus. Zool. Univ. Napoli*, VII (8): 1-30.

MAGISTRETTI M., 1956 b - Ricerche Zoologiche sul Massiccio del Pollino. XIII. *Coleoptera* 3. *Oedemeridae, Meloidae, Alleculidae. Ann. Ist. Mus. Zool. Univ. Napoli*, VII (10): 1-6.

MAGISTRETTI M., 1962 - Ricerche coleotterologiche sul litorale ionico della Puglia, Lucania e Calabria; Campagne 1956-1957-1958. IX, *Coleoptera Oedemeridae, Pyrochroidae, Meloidae, Lagriidae, Alleculidae. Boll. Soc. ent. ital.*, 92: 83-92.

MAGISTRETTI M., 1965 - *Coleoptera. Cicindelidae, Carabidae*. Catalogo topografico. Fauna d'Italia, VIII. Ed. Calderini, Bologna, 512 pp.

MAGISTRETTI M., 1967 - Catalogo degli *Oedemeridae* italiani. *Mem. Soc. ent. ital.*, 46: 181-200.

MAGISTRETTI M., 1969 - Catalogo topografico dei *Coleoptera Cicindelidae* e *Carabidae* d'Italia. I Supplemento. *Mem. Soc. ent. ital.*, 47: 177-217.

MAGISTRETTI M. & RUFFO S., 1960 - Considerazioni sulla diffusione nell'Italia appenninica di alcuni generi di Coleotteri Carabidi e Crisomelidi. *Atti Acc. Naz. ital. Entomol.*, 8: 137-179.

MAGNANO L. 1957 - Ricerche Zoologiche sul Massiccio del Pollino. XXIV. *Coleoptera* - 14. *Curculionidae*. *Ann. Ist. Mus. Zool. Univ. Napoli*, IX (1): 1-53.

MAGRINI P., 1984 - *Trechus angelae* n. sp. dell'Appennino Calabro-Lucano. *Redia*, 67: 247-252.

MAGRONE R. & PAPINI G., 1966 - Note Coleotterologiche. I. *Boll. Ass. Romana Entomol.*, 21 (3): 36-39.

MAREK O., 1961 - Eine gebirgsausbeute von Nitiduliden aus den Apenninen. *Mem. Mus. Civ. St. nat. Verona*, 9: 1-4.

MARIANI G., 1958 - Revisione delle specie italiane di *Geotrupes* subgen. *Trypocopris*. *Mem. Soc. ent. ital.*, 38: 23-43.

MARIANI G., 1971 - Zoogeografia degli Scarabeidi Laparosticti orofili dell'Appennino centrale (*Coleoptera Scarabaeoidea*). *Lav. Soc. ital. Biogeogr.*, (N.S.), 2: 225-270.

MASUTTI L., 1968 - Coleotteri Scolitidi dei Pini d'altitudine in alcuni biotopi delle Alpi e sul Massiccio del M. Pollino. *Arch. Bot. Biogeogr. ital.*, 44: 213-223.

MEGGIOLARO G., 1960 - Ricerche coleotterologiche sul litorale ionico della Puglia, Lucania e Calabria, Campagne 1956-1957-1958. IV. *Coleoptera Pselaphidae*. *Boll. Soc. ent. ital.*, 90: 80-94.

MEGGIOLARO G., 1966 - Su alcuni euplectini paleartici. *Boll. Soc. ent. ital.*, 96: 163-168.

MIKSIC R. 1959 - Ricerche Zoologiche sul Massiccio del Pollino. XXIX. *Coleoptera* - 15. Beitrag zur Kenntnis der Lamellicornis-Fauna der Apenninen. *Ann. Ist. Mus. Zool. Univ. Napoli*, XI (8): 1-24.

MINELLI A. & VITTORELLI S., 1976 - Il Rassenkreis *Timarcha tenebricosa* (F.) (*Coleoptera Chrysomelidae*). *Boll. Mus. Civ. St. nat. Verona*, 3: 1-33.

MOSCARDINI C., 1968 - I Coleotteri Cantaridini della Regione Appenninica (*Col. - Cantharidae*). *Mem. Mus. Civ. St. nat. Verona*, 16: 49-96.

MÜLLER G., 1955 - Ricerche Zoologiche sul Massiccio del Pollino. XVI. *Coleoptera* - 6. *Histeridae*. *Ann. Ist. Mus. Zool. Univ. Napoli*, VII (13): 1-7.

OSELLA G., 1975 - Descrizione di due nuove specie di *Phloeophagus* Schh. e brevi note sulla corologia e sulla ecologia di *P. gracilis* Rosenh. e *P. lignarius* Marsham. *Boll. Mus. Civ. St. nat. Verona*, 1: 415-426.

OTERO J. C. & ANGELINI F., 1981 - Su alcuni *Cryptophagus* italiani nuovi o poco conosciuti. *Boll. Soc. ent. ital.*, 113: 96-100.

OTERO J. C. & ANGELINI F., 1984 - Contributo alla conoscenza dei *Cryptophagidae* italiani. *Entomologica*, Bari, 19: 81-96.

PACE R., 1977 - Quindici nuove specie di Stafilinidi ipogei dell'Italia centro-meridionale. *Redia*, 60: 125-177.

PARDO ALCAIDE A., 1961 - Ricerche Zoologiche sul Massiccio del Pollino. XXXI. *Coleoptera* 16. *Lycidae* y *Malachiidae* de los Montes Pollino y Aspromonte (Italia meridionale). *Ann. Ist. Mus. Zool. Univ. Napoli*, XVII (3): 1-8.

PARDO ALCAIDE A., 1967 - Notas sobre *Malachiidae* del Mediterraneo Occidental (Col.) V. *Mem. Mus. Civ. St. nat. Verona*, 15: 97-104.

PIEROTTI H. 1976 - Ritrovamento dell'*Aphodius ragusae* Reitt. in Basilicata e in Sicilia. *Lav Soc. Ven. Sc. nat.*, 1: 37-41.

PIEROTTI H., 1977 - Contributo alla conoscenza degli *Aphodius* della Calabria e del Pollino. *Boll. Soc. ent. ital.*, 109: 173-198.

PITTINO R. 1979 - Note su alcuni Coleotteri *Scarabaeoidea Laparosticta* della fauna italiana. *Boll. Ass. Romana Entomol.*, 34: 32-41.

Poggi R., 1984 - Note su alcuni *Pselaphidae* paleartici, con descrizione di *Bryaxis pescaroloi* n. sp. delle Alpi Pennine. *Boll. Soc. ent. ital.*, 116: 89-95.

Porta A., 1934 - *Fauna Coleopterorum Italica*. Supplementum 1°. Stab. Tipogr. Piacentino, Piacenza, 208 pp.

Porta A., 1949 - *Fauna Coleopterorum italica*. Supplementum 2°. Stab. Tipogr. Soc. An. G. Gandolfi, Sanremo, 386 pp.

Regalin R., 1980 - Le specie italiane del genere *Labidostomis* Redtenbacher. *Mem. Soc. ent. ital.*, 59: 37-48.

Ruffo S., 1964 a - Contributi alla conoscenza della distribuzione dei Coelotteri Crisomelidi nella Regione Appenninica. I. *Orsodacnini, Donaciini, Criocerini*. *Mem. Mus. Civ. St. nat. Verona*, 12: 41-96.

Ruffo S., 1964 b - Contributo alla conoscenza della distribuzione dei Coleotteri Crisomelidi nella Regione Appenninica. 2. *Alticini*: generi *Sphaeroderma, Argopus*. *Mem. Mus. Civ. St. nat. Verona*, 12: 97-106.

Sama G., 1979 - Note ecologiche e geonemiche su alcuni Buprestidi italiani. *Boll. Ass. Romana Entomol.*, 34: 16-17.

Sanfilippo N., 1955 - Ricerche Zoologiche sul Massiccio del Pollino. XVII. *Coleoptera* - 7. *Dytiscidae, Gyrinidae*. *Ann. Ist. Mus. Zool. Univ. Napoli*, VII (14): 1-4.

Schatzmayr A., 1943 - Appunti coleotterologici. *Natura*, Milano, 34: 135-136.

Scheerpeltz O., 1956 - Ricerche Zoologiche sul Massiccio del Pollino. XXII. *Coleoptera* - 12. Neue Kurzflugler aus Suditalien (*Col., Staphylinidae*). *Ann. Ist. Mus. Zool. Univ. Napoli*, VIII (10): 1-33.

Smetana A., 1954 - Ein Beitrag zur Kenntnis der italienischen *Philonthus* und *Gabrius*-Arten. *Ent. Tidskr.*, 75 (1): 39-43.

Tamanini L., 1955 - Ricerche Zoologiche sul Massiccio del Pollino. XIV. *Coleoptera* - 4. *Catopidae, Liodidae, Scaphidiidae, Silphidae*. *Ann. Ist. Mus. Zool. Univ. Napoli*, VI (1): 1-19.

Tassi F., 1966 a - Su alcuni Buprestidi italiani nuovi o particolarmente interessanti. *Boll. Soc. ent. ital.*, 96: 17-27.

Tassi F., 1966 b - Ricerche Zoologiche sul Massiccio del Pollino. XXXII. *Coleoptera* 17. *Cerambycidae*. *Ann. Ist. Mus. Zool. Univ. Napoli*, XVII (6): 1-65.

Tassi F., 1970 - Alcuni reperti interessanti dai Monti della Laga. *Boll. Ass. Romana Entomol.*, 25: 101-106.

Vienna P., 1971 - Gli *Histeridae* del Museo Civico di Storia Naturale di Verona. *Mem. Mus. Civ. St. nat. Verona*, 19: 267-301.

Vienna P., 1980 - *Coleoptera Histeridae*. Fauna d'Italia. XVI. Ed. Calderini, Bologna, 386 pp.

Zampetti M. F., 1979 - Note sulla geonemia di alcuni Coleotteri Clavicorni. *Boll. Soc. ent. ital.*, 111: 96-97.

Zampetti M. F., 1982 - Posizione sistematica di alcune specie appartenenti al genere *Bruchidius* Schilsky. *Boll. Mus. Civ. St. nat. Verona*, 8: 383-410.

Zanetti A., 1977 - Due nuove specie di *Staphilinidi* (Col.) dell'Appennino. *Boll. Mus. Civ. St. nat. Verona*, 4: 307-315.

Zanetti A., 1978 - Note sulle specie italiane del genere *Acrolocha* Thoms. con descrizione di una nuova specie (*Col. Staphylinidae*). *Boll. Mus. Civ. St. nat. Verona*, 5: 547-553.

Zanetti A., 1982 - Materiali per una revisione degli *Eusphalerum* italiani e centro europei con descrizione di nuove sottospecie e note sinonimiche. *Boll. Mus. Civ. St. nat. Verona*, 8: 97-156.

Wittmer W., 1935 - Risultati scientifici delle cacce entomologiche di S.A.R. il Principe Alessandro Della Torre e Tasso in Italia. IV. *Malacodermata* vom M.te Pollino (Lucania). *Boll. Soc. ent. ital.*, 67: 72-76.

Indirizzo dell'Autore: Fernando Angelini
via Imperiali, 203
72021 Francavilla Fontana (Brindisi)